

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

STREPTOCIDĂ 10%
unguent

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitați.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE INREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Numele și adresa, „Medicamentum” SRL, R. Moldova, r. Anenii Noi,

s. Merenii Noi

telefon/fax: +373 /265/ 62-3-17, 62-2-46, 62-4-39

e-mail: contact@medicamentum.md

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

STREPTOCIDĂ 10%, unguent

Unguent antimicrobian din grupa sulfanilamidelor cu spectru larg de acțiune pentru: cabaline, bovine, suine, ovine, caprine, câini, pisici.

1,0 g STREPTOCIDĂ 10%, unguent conține:

Substanța activă:

– Streptocidă – 100 mg

Excipienti:

– Vaselină – 900 mg

3. INDICAȚII TERAPEUTICE(*pe specii țintă*)

Medicamentul este indicat în tratamentul afecțiunilor cutanate produse de bacteriile sensibile la sulfanilamide (procese infecțioase superficiale a mucoaselor, ulcere trofice, arsuri, degerături, infecții chirurgicale superficiale și piodermii), la toate speciile de animale.



4. CONTRAINDICAȚII

Medicamentul trebuie să fie administrat cu precauție la animalele.

Nu se administrează la animalele cu hipersensibilitate cunoscută la substanța activă sau la excipient.

5. REACȚII ADVERSE

Nu sunt.

6. SPECII ȚINTĂ

-Cabaline, bovine, ovine, caprine, suine, câini, pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Unguentul se aplică extern!

Se aplică unguentul într-un strat subțire de două ori pe zi, timp de 5-7 zile, după caz, pînă la dispariția simptomelor de boală.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Zero zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemîna copiilor.

A se păstra în loc uscat, la temperatura 18 - 20°C, ferit de lumină.

A nu se utilza după data expirării marcată pe ambalaj.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Nu se cunosc efecte toxice asupra mediului. După golire ambalajele se vor depozita în recipiente de colectare.

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de medicamente, trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE (interdicții)

Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă.

Nu sunt.

Precauții speciale de utilizare la animale:

Nu este cazul.



Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanța activă trebuie să evite contactul cu medicamentul de uz veterinar.

În cazul ingestiei accidentale se va apela la medic, căruia i se va prezenta prospectul sau eticheta medicamentului.

La aplicarea medicamentului se vor utilize mănuși de protecție sterile.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouăt:

Se utilizează în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată de medicul veterinar.

Testele de laborator la șoareci și șobolani nu au evidențiat efecte teratogene, fetotoxice sau maternotoxicice.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu se administrează concomitent cu alte medicamente de uz extern.

Incompatibilități:

Datorită riscului de apariție a unor incompatibilități, evitați amestecarea cu alte medicamente de uz veterinar.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate în ambalaj original – 24 luni

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar – 90 zile.

A nu se utilizează după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescriptie veterinară

14. NATURA SI COMPOZITIA AMBALAJULUI PRIMAR

Borcănase 70 g ambalate în cutie de carton, însotite de prospectul de utilizare.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

12 2021

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

