

INSTRUCȚIUNE PENTRU UTILIZARE

KOKCISAN[®] 120 g
granulat pentru profilaxia coccidiozei la pui broiler
(organizația elaboratoare KRKA d.d, Novo Mesto, Slovenia)

I. Informații generale

1. Denumirea comercială

Kokcisan[®] 120 g granulat

DCI-ul substanței active

Salinomycinum

2. Forma farmaceutică

Pulbere microgranulată pentru uz oral

Compoziție

Kokcisan[®] 120 g granulat conține în calitate de substanță activă salinomicină sodică – 120 mg/g, iar în calitate de excipient cretă – până la 100%.

3. Păstrare

Kokcisan[®] 120 g granulat se păstrează la loc uscat, ferit de lumină, la temperatura de la 0 °C până la 25 °C, în ambalajul producătorului.

A se păstra separat de produse alimentare și hrana pentru animale.

Kokcisan[®] 120 g granulat este disponibil în saci multistratificați din hârtie, închiși ermetic.

4. Termen de valabilitate

Termenul de valabilitate al adausului alimentar cu condiția respectării condițiilor de păstrare în ambalajul închis - 3 ani de la data producerii, după deschiderea sacului – 3 luni.

Este interzisă utilizarea după expirarea termenului de valabilitate.

5. A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

6. Adausul alimentar neutilizat trebuie nimicit în conformitate cu reglementările locale.

II. Proprietăți farmacologice

7. Kokcisan[®] 120 g granulat se referă către antibioticele anticoccidiene din grupul ionoforilor.

Salinomicina sodică din compoziția adausului alimentar este activă față de majoritatea speciilor de coccidii, care parazitează la păsări, inclusiv: *E. tenella*, *E. necatrix*, *E. mivati*, *E. maxima*, *E. brunetty*, *E. mitis*, *E. praecox*.

Mecanismul de acțiune al salinomicinei este determinat de tulburarea transportului de sodiu și potasiu la formele sexual imature de coccidii, care duce la moartea acestora în faza de schizogonii.

După administrarea orală salinomicina sodică practic nu se absoarbe în tractul gastrointestinal și își manifestă acțiunea la nivelul mucoasei și submucoasei intestinale.

Se elimină din organismul păsărilor preponderent sub formă nemodificată cu găinașul păsărilor timp de 3-4 zile.

Kokcisan® 120 g granulat după gradul acțiunii asupra organismului se atribuie la substanțe cu potențial toxic mediu (clasa 3 de pericol conform GOST 12.1.007-76), în dozele recomandate nu provoacă la păsări reacții adverse și complicații.

III. Mod de utilizare

8. Kokcisan® 120 g granulat se indică pentru profilaxia coccidiozei la pui broiler.

9. Kokcisan® 120 g granulat nu se va utiliza la găinile ouătoare, efective de reproducție, curci, animale copitate.

10. Kokcisan® 120 g granulat se include în rația alimentară în doza de 500 g la o tonă de nutreț, ceea ce corespunde cu 60 mg salinomicină sodică la 1 kg de nutreț și se administrează puilor broileri din prima zi de viață pe toată perioada de creștere.

Se exclude din rație cu 5 zile înainte de sacrificare.

Pentru asigurarea unei distribuiți omogene a adausului în nutreț se folosește amestecarea în două trepte:

doza zilnică calculată de Kokcisan® 120 g granulat pentru numărul de pui prelucrați, se amestecă cu o cantitate mică de nutreț combinat (până la 10% din consumul zilnic), iar apoi se introduce prin amestecare minuțioasă în nutrețul destinat pentru consumul de către păsări timp de o zi.

11. Simptomele de supradozaj la păsări nu s-au stabilit.

12. Particularități de acțiune a produsului la prima administrare și la întreruperea lui nu s-au stabilit.

13. În cazul omiterii unei doze utilizarea se reia în aceeași doză și conform aceleiași scheme.

14. La utilizarea Kokcisan® 120 g granulat în conformitate cu prezenta instrucțiune de utilizare la puii broiler nu au fost stabilite reacții adverse și complicații.

15. Nu se admite utilizarea concomitentă de Kokcisan® 120 g granulat cu alte remedii anticoccidozice, sulfanilamide, eritromicină și oleandomicină, de asemenea, concomitent cu tiamulină, de asemenea, cu 7 zile până la și timp de 7 zile după finisarea administrării acestea.

16. Sacrificarea puilor broileri pentru carne se permite nu mai devreme, decât peste 5 zile de la ultima administrare de Kokcisan® 120 g granulat. Carnea păsărilor, care au fost sacrificate înainte de termenul stabilit, poate fi folosită pentru hrana animalelor pentru blană.

IV. Măsuri de profilaxie individuală

17. Toate lucrările cu Kokcisan® 120 g granulat se vor efectua cu utilizarea hainelor speciale și a mijloacelor individuale de protecție (mănuși de cauciuc, ochelari de protecție, mască respiratorie).

18. În timpul lucrărilor se interzice consumul alimentelor sau a lichidelor, precum și fumatul. După finisarea lucrărilor se vor spăla minuțios fața și mâinile cu apă și săpun, iar cavitatea bucală se va clăti cu apă.

19. Ambalajele goale de sub adausul alimentar nu trebuie utilizate în scopuri managere; acestea se depozitează într-un loc special predestinat și se nimicesc împreună cu deșeurile menajere.

20. Denumirea și adresa producătorului

KRKA d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, 8501,
Novo mesto, Slovenia.

Numărul certificatului de înregistrare: