

A fi utilizat numai de către Medici veterinari înregistrați sau Spitale sau Laboratoare.

/Imaginea unui câine/

VACCIN VETERINAR ANTIRABIC, INACTIVAT B.R (Vet.)

**Raksharab®**

Numai pentru uz veterinar

**COMPOZIȚIA:**

Fiecare 1 mL conține: Antigen viral antirabic inactivat de potență  $\geq 1.0$  IU [tulpină de virus rabic CVS propagat pe celulele BHK] absorbit de gel de hidroxid de aluminiu, Tiomersal B.R în calitate de conservant  $\leq 0.02$  % procentaj greutate / volum și diluant din tampon de fosfat cantitatea suficientă (Quantum satis) la 1 mL.

**DESCRIEREA:**

Vaccinul Raksharab® conține culturi de țesuturi a virusului Rabic produs în linia de celule BHK 21, provenit din celule de Rinichi de Pui de Hamster și inactivat cu compus de aziridină. Rabia este o boală zoonotică care cauzează inflamarea creierului și este de obicei fatală. Rabia infectează în principal mamiferele și este cauzată de virusul rabic. Singura soluție de prevenire a rabiei este vaccinarea la timp cu vaccinul anti-rabic.

**INDICAȚII:**

Vaccinul Raksharab® este indicat pentru imunizarea câinilor și a altor animale domestice.

**DOZARE ȘI ADMINISTRARE:**

1 mL trebuie administrat intramuscular sau subcutanat printr-o zonă de piele curată, uscată, cu respectarea tuturor precauțiilor aseptice.

Pentru fiecare vaccinare trebuie utilizate un ac și o seringă sterile.

**REGIM DE VACCINARE:**

Vaccinul este destinat pentru imunizarea împotriva rabiei prin utilizarea sa numai în scop profilactic.

Tipul regimului de vaccinare	1-a vaccinare	A 2-a vaccinare	Revaccinarea
Utilizare profilactică	Vârsta 3 luni (12-13 săptămâni) și mai sus. (în cazul în care vaccinul este administrat sub 3 luni, se recomandă un rapel la 3 luni).	După 4 săptămâni de la prima vaccinare, atunci când vaccinarea primară se efectuează la vârsta de 3 luni a animalului.	Anual.

**IMUNITATEA:**

Se acordă o perioadă de imunitate de 36 luni, cu toate acestea, vaccinarea anuală este recomandată în zonele endemice.

**CONTRAINDICAȚII:**

- Animalele cu boli pre-existente / boli de incubație / stres de la transportare și animalele care se recuperează după o boală nu trebuie vaccinate.
- Animalele care suferă de febră, malnutriție, infecții ale pielii, infecții parazitare și infestări și animalele aflate sub tratament cu corticosteroizi nu trebuie vaccinate.

**PRECAUȚII:**

- În caz de reacții alergice după vaccinare, trebuie inițiată administrarea unor medicamente adecvate, cum ar fi adrenalina, corticosteroizii și alte tratamente anti-alergice sub supravegherea medicului veterinar.

Negru

Pagina de pe verso

Dimensiunea : 76 x 135 mm

**REAȚII ADVERSE:**

- În general, nu a fost observată nici o reacție adversă.
- Ocazional s-ar putea să apară o durere tranzitorie, indurație la locul injectării, care trece în câteva zile.

**VACCINAREA ANIMALELOR GESTANTE, CARE ALĂPTEAZĂ:**

Vaccinul Raksharab\* este sigur de a fi utilizat la animalele gestante și în perioada de lactație. Trebuie să fie luată o mare grijă în timpul vaccinării în cazul unei perioade avansate gestațională, pentru a evita stresul.

**EFECTE CU ALTE VACCINURI:**

Nu sunt disponibile informații cu privire la compatibilitatea acestui vaccin cu alte vaccinuri. Prin urmare, siguranța și eficacitatea acestui produs atunci când este utilizat împreună cu alte vaccinuri nu au fost demonstrate.

**PERIOADA DE AȘTEPTARE:** Zero zile.

**SUPRADOZAJ:**

În testele de siguranță, a fost administrată o doză dublă la speciile țintă și nu s-a depistat sau confirmat nici o reacție adversă în condiții de fermă.

**CONDIȚII DE DEPOZITARE ȘI TRANSPORTARE:**

Păstrați și transportați vaccinul între 2 ° C și 8 ° C. Antigenicitatea vaccinului se deteriorează dacă temperatura nu este menținută în intervalul recomandat. Rata de deteriorare depinde atât de temperatură, cât și de timp.

Evitați înghețarea. Aruncați vaccinul dacă conținutul este congelat.



### **MANIPULAREA FLACOANELOR CU DOZE MULTIPLE:**

Întregul conținut al flacoanelor cu doze multiple trebuie să fie utilizat în termen de 7 zile de la prima înțepătură. Trebuie acordată atenție deosebită împotriva contaminării și de a plasa vaccinul la temperatura de depozitare recomandată după fiecare retragere.

AGITAȚI BINE ÎNAINTE DE FOLOSIRE. A NU SE PĂSTRA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR.

### **TERMEN DE VALABILITATE:**

36 luni de la data fabricației, atunci când este păstrat în condițiile de depozitare recomandate (2 ° C și 8 ° C).

### **ELIMINAREA CONTAINERELOR FOLOSITE:**

Containerele goale ale vaccinului, seringile și acele folosite trebuie să fie eliminate în mod corespunzător și cu atenție în conformitate cu cerințele de reglementare locale.

### **PREZENTARE:**

Vaccinul Raksharab\* este disponibil sub formă de flacoane de 1 mL, 5 mL, 10 mL, 20 mL și 30 mL.

**Avertizare:** De a fi comercializat cu amănuntul numai pe baza prescripției (rețetei) unui medic autorizat veterinar.

**NU ESTE DESTINAT PENTRU UTILIZARE UMANĂ. NUMAI PENTRU**

**TRATAREA ANIMALELOR**

**Fabricat și Comercializat de către:**

**INDIAN IMMUNOLOGICALS LIMITED**

(O filială deținută în întregime a Consiliului Național de Dezvoltare pentru produsele lactate)

Rakshapuram, Gachibowli Cutia poștală, Hyderabad - 500 032, INDIA.

Numerele de telefoane: +91-40 23000211, +91-40-23000212; Fax: +91-40-23000213;

Web: [www.indimmune.com](http://www.indimmune.com)

® Marcă comercială înregistrată

PLL0482/02/14

Negru