

## **Instrucțiune pentru utilizare**

### **VIREX**

**Dezinfectant pe baza de peroxizi**  
**Pentru suprafețe, echipamente și sisteme de apă**

#### **CONȚINE: Peroximonosulphate 50%**

Pulbere hidrosolubilă cu un puternic efect Virulicid, Bactericid și Fungicid, aprobat de DEFRA pentru combaterea Febrei Aftoase, Boala Veziculoasă a Porcului, etc. Sigur pentru operatori. Biodegradabil. Non –Coroziv .

#### **Mod de folosire:**

Virex poate fi folosit în dezinfecția terminală. Dezinfecția suprafețelor și a utilajelor prin aspersare: diluați 1:300 și aplicați 300ml/m<sup>2</sup>. Virex poate fi folosit și prin termonebulizare în combinație cu soluție de glicoli.

**DEFRA** (Departamentul pentru Mediu, Produse Alimentare și Afaceri Rurale din Marea Britanie) **a testat și aprobat produsul pentru următoarele diluții:**

**Febra Aftoasă:** 1 parte VIREX în 1300 părți apă.

**Boala Veziculoasă a Porcului:** 1 parte VIREX la 200 părți apă.

**Boli ale Pasarilor:** 1 parte VIREX în 300 părți apă.

**Salmonelloza:** 1 parte VIREX la 100 părți apă.

Dezinfecția colanelor de apă în perioada efectuării dezinfecției terminale:

Reglați Dozatronul pentru diluția 0,5%, și inundați coloanele de apă. Lăsați pentru o oră, după care clătiți cu apă curată. Dezinfecția apei de băut cu animalele în hală, folosiți diluția 1:1000, retrageți din consum cu cel puțin 48 de ore înainte și după vaccinare / vitaminizare.


#### **Dezinfectant rutier și filtru sanitar:**

Rata de diluție 1:100. Virex a fost testat folosind testele EN împotriva următorilor agenți etiologici; Chicken anaemia, Gumboro, Avian Influenza, Egg Drop Syndrome, Aujeszky's, Tenosynovitis, Porcine Blue Ear / PRRS, PCV2, Parvoviral Enteritis, Infectious Bovine Rhinotracheitis.

**Virex și-a demonstrat eficiența în urma testelor EN, și împotriva următorilor agenți etiologici:** Bacillus, Helicobacter, Streptococcus, Campylobacter, Listeria, Vibrio, Clostridium, Proteus, Candida, Enterococcus, Pseudomonas, Dermatophilus, E. coli, Salmonella, Microsporum, Haemophilus, Staphylococcus, Trichophyton.

**Ambalare:** 5,10,50 kg

**Depozitare:** Păstrați în loc răcoros, uscat.





**Valabilitate:** 2 ani. Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 60 zile.

*„ A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj ”  
În caz de apariție a oricăror reacții adverse, contactați deținătorul certificatului de înregistrare Si/sau Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor”.*

**Producător: Kilco, Marea Britanie**

**Numele și adresa deținătorului autorizației de comercializare: Kilco, Marea Britanie**

**Deținătorul certificatului de înregistrare în Republica Moldova: SRL „SUM AGRO Service”, or. Chișinău str. Feredeului 12 tel/fax 022 276 062**

