

Brovalevamisol 8% (soluție injectabilă)

Descrierea: Soluție incoloră, transparentă, fără impurități, cu miros specific.

Compoziție: 1 ml de preparat conține în calitate de substanță activă (mg):
levamisol hidroclohid - 80,0 și apă apirogenă.

Particularități farmacologice:

ATCvet QP52, preparate antihelmintice veterinare (QP52AF01, levamizol)

Levamisol hidroclohid - compus sintetic din grupul imidazotiazolilor. Blocând fermentul de bază a metabolismului, fumarat-reductaza și formarea ATF, levamisolul provoacă paralizia centrelor nervoase, ceea ce duce la paralizia și moartea nematodelor în primele 12-24 ore după administrare. În ficat, preparatul metabolizează în oximercaptoetilfenilimidasolidin. Acesta din urmă posedă acțiune imunostimulatoare asupra organismului păsărilor și mamiferelor.

Mod de administrare: Tratamentul și profilaxia bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, carnasierelor și păsărilor în cazul bolilor provocate de :

Bovine, ovine și caprine: nematode gastrointestinale și pulmonare: *Trichostrongylus columbriformis*, *T. axei*, *Oestertagia circumcincta*, *Haemonchus contortus*, *Nematodirus spatiger*, *Oesophagostomum venulosum*, *O. colimbianum*, *O. radiatum*, *Bunostomum trigonocephalus*, *Trichuris skrjabini*, *T. ovis*, *T. globulosa*, *Strongyloides papillosus*, *Dictyocaulus filaria*, *D. Viviparus*, *Muellerius capillaris*, *Protostrongylus kochi*, *Neoscaris vitulorum* ș.a.,

Porcine: nematodele *Ascaris suum*, *Trichuris suis*, *Oesophagostomum dentatum*, *Metastrongylus elongatus*, *M. Pudentotectus*, *M. Salmi*, *M. Pulmonalis*, *M. tschauricus*, *Ollulanus tricuspis*, *O. Suis*, *Strongyloides ransomi*;

Păsări (găini, găște, curci, porumbei): *Ascaridia galli*, *Heterakis gallinarum*, *Capillaria spp.*, *Trichostrongylus spp.*

Dozaj și mod de administrare:

- **Bovine:** subcutan (lateral, la gât) sau i/muscular (anconeus) regiunea antebrațului în doză de - 1 ml/10 kg masă corp, dar nu mai mult de 30 ml per cap la o administrare. Dozajul mai mare de 15 ml se divizează în două părți care se administrează în două puncte diferite.
- **Porcine:** subcutan (după ureche) sau i/muscular în doză de 1 ml/10 kg masă corp pînă la greutatea de 150kg și 2,5 ml la fiecare următoare 50 kg de masă corp, o singură dată. Doza mai mare de 10 ml se divizează în două părți care se administrează în puncte diferite;
- **Ovine, caprine:** s/cutan, o singură dată, în doză de 1 ml/10 kg masă corp, dar la greutate mai mare de 50 kg - 6 ml, o singură dată;

- *Păsări*: per oral, în apa de băut, în doză de 3-4 ml/10 kg masă corp, o singură dată sau dozajul dat se divizează și se administrează timp de 3-4 zile;
- *Porumbei*: 1 ml - 200 ml apă; soluția curativă se folosește în loc de apa de băut, timp de 3-5 zile.

Contraindicații: Nu se indică animalelor bolnave și cașcesice!

A nu se administra femelelor în ultimul trimestru a gestației, animalelor de prăsilă în timpul monteii și găinilor ouătoare!

Preparatul Levamisol nu se administrează concomitent cu pirantelul, morantelul, preparatele fosfororganice și neostigmina!

Precauții: Sacrificarea animalelor pentru consum uman se permite peste 7 zile de la ultima administrare, laptele și ouăle se dau în consum peste 3 zile. În caz de sacrificare pînă la expirarea termenului limită, carcasele se folosesc în hrana animalelor de blană sau la producerea făinii din carne-oase, laptele se dă de băut animalelor neproductive în dependență de prescripția medicului veterinar.

Mod de prezentare: Fiole din sticlă sau polietilenă a câte 2, 5 și 10 ml; flacoane din sticlă întunecată a câte 10,20,50, 100 și 200 ml; flacoane din polietilenă a câte 50 și 100 ml.

Condiții de păstrare: La loc uscat, ferit de lumină, inaccesibil pentru copii, la $T^{\circ}C+1+25^{\circ}C$.

Valabilitate: 3 ani.

Producător: OOO „Brovafarma”, Ucraina, or.Brovări, reg. Kiev, bul.Nezavisimosti 18a, 07400

Distribuitor oficial în R. Moldova: SRL „Zoofarmagro”, m.Chișinău, str. Camenița 4A, tel/fax +373022855-071; +373022855-073