

# PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

## Dana<sup>R</sup> Spot-on

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitați.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă mediculei veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

### **1.DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.**

OOO"API-SAN ", or.Moscova, str.Ac.Arțimovicia , 3/1, ap.222

OOO"Apicenna" , 123242, or.Moscova, str. Drujinnikovskaia,

15, et.5, c I, oficiu 532/5

89626252752

e [karbysheva@apicenna.ru](mailto:karbysheva@apicenna.ru)

### **2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA**

Dana<sup>R</sup> Spot-on (*Dana Spot-on*). Denumirea internațională nepatentată: fipronil. Preparatul conține în calitate de substanță activă: fipronil.

### **3. INDICAȚII TERAPEUTICE**

Dana<sup>R</sup> Spot-on se indică cîinilor și pisicilor de la vîrsta de 12 săptămîni în tratamentul și profilaxia entomozelor provocate de purici și păduchi malofagi și hematofagi; acarozelor provocate de căpușele sarcoptice, ixode și *Demodex*, animalelor de blană în tratamentul și profilaxia otodectozei.

### **4.CONTRAINDIКАȚII**

Sensibilitate individuală sporită a animalului la componentele preparatului (inclusiv în anamneză), animale bolnave de boli infecțioase și în perioada de covalescență, cîinii cu greutatea sub 2 kg, pisici sub 1 kg, tineret pînă la 12 săptămîni și animalele productive. Nu se admite administrarea auriculară (rîie auriculară) în caz de timpan perforat.

### **5.REACȚII ADVERSE**

La administrarea conform instrucțiunii , nu apar. În caz de hipersensibilitate individuală la componentele preparatului și apariția iritațiilor, prelucrarea se stopează, Dana<sup>R</sup>Spot-on se spală de pe suprafața pielii cu apă și săpun și la necesitate se indică terapie desensibilizantă.

### **6.SPECII ȚINTĂ**

Cîini, pisici.



## 7.POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

În tratamentul și profilaxia entomozelor, în combaterea căpușelor ixode, Dana<sup>R</sup> Spot-on se indică, 1 dată, prin aplicare (“spot-on”) pepielea intactă și uscată în locurile inaccesibile pentru lingere (pe gât la baza craniului, între umeri), folosind pipeta de volum corespunzător conform tabelului:

Denumirea preparatului	Volumul de preparat per animal, ml	Numărul de pipete și volumul nominal p/u 1 prelucrare
Dana <sup>R</sup> Spot-on pentru căței și cîini de la 2kg la 10kg	1,5 ml	1 pipetă de 1,5 ml
Dana <sup>R</sup> Spot-on pentru căței și cîini de la 10kg la 20kg	3 ml	2 pipete de 1,5 ml
Dana <sup>R</sup> Spot-on pentru căței și cîini de la 20kg la 40kg	4,5 ml	3 pipete de 1,5 ml
Dana <sup>R</sup> Spot-on pentru cîini mai mari de 40 kg	6 ml	4 pipete de 1,5 ml
Dana <sup>R</sup> Spot-on pentru motănași și pisici pînă la 3 kg	0,5 ml	1 pipetă de 0,5 ml
Dana <sup>R</sup> Spot-on pentru pisici mai mari de 3 kg	1,0 ml	1 pipetă de 1,0 ml

Prelucrările repetitive în perioada activității maxime a paraziților se efectuiază la necesitate, dar nu mai des de 1 dată pe lună, în cazul scăldărilor frecvente cu săpun sau şampon(mai mult de 2 ori pe lună)-nu mai des de 1 dată în 2 săptămâni.


În scopuri preventive a unor noi invazii de purici, se schimbă așternuturile sau se prelucrăza cu preparate insecticide conform instrucțiunilor.

Pentru combaterea căpușelor ixode pe corpul animalui, se aplică 1-2 picături de Dana<sup>R</sup> Spot-on pe căpușă și locul fixării ei pe piele. Dacă timp de 20-30 minute căpușa nu cade, ea se extrage atent și se nimicește.

În tratamentul otodectozei (rîie auriculară) la cîini, pisici și animale de blană mai întîi se sanează canalul auditiv și pavilionul urechii curățîndu-l de cruste și eliminări, apoi se picură în ambele urechi câte 3-5 picături de preparat și se masează baza urechii. Prelucrările se efectuiază de 2-3 ori cu interval de 5-7 zile. La necesitate cura se repetă.

Preparatul Dana<sup>R</sup> Spot-on se picură obligator în ambele urechi.

În caz de sarcoptoză, notoedroză sau demodecoză, preparatul se aplică pe suprafața afectată, curățată de cruste, cu un tampon de la periferie spre centru cuprinzînd 1 cm din țesutul limitrof. În cazuri severe, se recomandă terapie complexă cu preparate simptomatice. Prelucrările se efectuiază de 3-5 ori cu interval de 7-10



zile, pînă la însănătoșirea animalului care se confirmă cu două rezultate acarologice negative.

## **8.PERIOADA DE AȘTEPTARE**

Nu este cazul.

## **9.PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE**

A se păstra în ambalajul închis al producătorului, ferit de raze solare directe, separat de produse alimentare și furaje, la  $T^{\circ}\text{C} 2^{\circ}\text{C}+25^{\circ}\text{C}$ , în locuri inaccesibile copiilor.

## **10.PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA**

### **MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR**

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu legislația în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

## **11.ATENȚIONĂRI SPECIALE**

Pentru a nu permite lingerea preparatului, animalului i se îmbracă botniță sau guler de protecție care se scoate peste 15-20 minute după prelucrare.

A nu se aplica preparatul pe pielea umedă sau lezonată, scăldatul în bazine acvatice, scăldatul cu şampon sau săpun se permite peste 48 ore după prelucrare.

A se evita devierile de la schema de bază a administrărilor pentru a nu diminua eficiența preparatului. În caz de omitere a unei prelucrări, aplicarea se reea în aceeași doză conform aceeași scheme.

În cazuri severe, adăugător se indică medicamente specifice și simptomatice conform instrucțiunilor.

## **12.PERIODA DE VALABILITATE**

2 ani din data producerii.

A nu se folosi după expirarea termenului indicat pe ambalaj.

## **13.STATUT LEGAL**

Se eliberează fără prescripție veterinară.

## **14.NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR**

Pipete din metalopolimer sau flacon din polimer cu picurător.

## **15.DATA ULTIMII REVIZUIRI A TEXTULUI**

25.01.2019

## **16. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA**

SRL "Zoofarmagro", m.Chișinău, str.Camenița 4a

tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; [zoofarmagro@mail.ru](mailto:zoofarmagro@mail.ru)

*NUMAI PENTRU UZ VETERINAR*

