

# INSTRUCȚIUNE

## Denumirea preparatului veterinar

Nobilis RT+IBmulti+ND+EDS, vaccin inactivat contra rinotraheitei, bronșitei infecțioase, bolii newcastle și sindromul scăderii ouatului la păsări.

## Compoziție

Fiecare doză (0,5ml) de vaccin conține

Substanțe active (virusi inactivați):

- virusul bronșitei infecțioase (IBV), tulpina M41 >4.0 log<sub>2</sub> unități VN;
- virusul bronșitei infecțioase (IBV), tulpina 249g >4.0 log<sub>2</sub> unități VN;
- virusul rinotraheitei infecțioase a curcilor (TRT), tulpina But1#8544 > 9,5log<sub>2</sub> EID unități;
- virusul sindromului căderii ouatului (EDS'76), tulpina BC14 >6,5log<sub>2</sub> unități IH.
- virusul bolii Newcastle (NDV), tulpina Clone 30 >60 PD<sub>50</sub> doze

Substanțe auxiliare:

adjuvant –parafină lichidă

- 215 mg;

inactivator – formaldehidă

< 0.05 %.

## Forma medicamentoasă

Emulsie.

## Puterea imunologică

Inducerea imunității de lungă durată contra bronșitei infecțioase de tip Massachusetts de două tipuri D274/D207, bolii Newcastle, sindromului căderii ouatului și contra acțiunii nocive a rinotraheitei infecțioase a curcilor. Imunitatea la păsări se formează după vaccinare și durează toată perioada de ouat cu condiția că prima vaccinare a fost efectuată cu vaccinuri vii contra bronșitei infecțioase, bolii Newcastle și rinotraheitei virale.

## Specia țintă

Găini

## Indicații

Vaccinul este destinat pentru imunizarea găinilor de rase ușoare și a șeptelului parental pentru protecția găinilor de bronșită infecțioasă tip (Massachusetts) tulpinile D274/D207, bolii Newcastle, sindromul căderii ouatului și contra acțiunii negative a rinotraheitei infecțioase.

## Contraindicații

Se vaccinează numai păsările sănătoase.

## Precauții

Înainte de utilizare flaconul cu vaccin se lasă la temperatura camerei până la atingerea temperaturii de 15-25°C. Pentru vaccinare se folosește instrumentar steril. Flaconul deschis se va folosi timp de 3 ore.

## Interacțiunea cu alte preparate

A nu se folosi cu alte preparate.

## Precauții în timpul ouatului

A nu se folosi.



**Mod de administrare și dozaj**

Fiecărei păsări a se administra 0,5 ml vaccin i/muscular în mușchiul pieptului sau subcutan în partea dorsală a gâtului.

**Programul de vaccinare**

Nobilis RT+IBmulti+ND+EDS se administrează în jurul vârstei de 14-20 săptămâni, dar nu mai târziu decât cu 4 săptămâni înainte de începutul oatului. Pentru un efect optim pasărea se recomandă să fie vaccinată cu vaccin viu contra bronșitei infecțioase, bolii Newcastle și rinotraheita virală. Un rezultat mai bun se va obține la administrarea vaccinului Nobilis RT+IBmulti+ND+EDS peste 4 săptămâni după imunizarea cu vaccin viu (praimer).

**Reacții adverse**

În locul inoculării poate apărea un nodul mic care trece de la sine.

**Timp de așteptare**

Zero zile.

**Atenționări speciale**

În caz de injectarea accidentală e necesar de adresat la medic cât de repede posibil și de informat că vaccinul este o emulsie apaoasă cu ulei mineral.

**Precauții speciale pentru utilizarea produsului nefolosit**

Preparatul expirat sau nefolosit se utilizează în conformitate cu legislația în vigoare (prin fierbere sau ardere).

**Valabilitate**

24 luni. După deschiderea flaconului -pînă la 3 ore.

**Condiții de păstrare**

A se păstra la loc uscat, ferit de lumină, la  $T^{+2+8^{\circ}\text{C}}$ . A nu se congela!

**Ambalaj**

Flacoane din sticlă de tip II (conform Farmacopeei Europene) sau din tereftalat de polițilenă cu a câte 500 sau 1000 doze. Flacoanele sunt închise cu dopuri din cauciuc nitrilic și capace din aluminiu.

**Deținătorul autorizației de comercializare:**

MSD Animal Health,  
Wim de Koverstraat 35,  
5831 AN Boxmeer  
The Netherlands

**Producător pentru eliberarea seriei:**

Laboratorios Intervet SA,  
Poligono Industrial, Salamanca,  
Spain

MSD Animal Health  
Wim de Körverstraat 35  
5831 AN Boxmeer  
The Netherlands

