

Instrucțiune pentru utilizare

VAPCOPHORE

Dezinfectant

COMPOZIȚIE: Conține o polialdehidă de acid carbonic a iodului complex cu acid ortofosforic în soluție apoasă, care conține 12,5% iodophore (echivalent la 2 % iod activ).

PROPRIETĂȚI:

VAPCOPHORE prezintă un spectru larg de eficacitate care acționează contra virusurilor, în special celor fără membrană (adeno-virusii) și are efect bactericid contra multor agenți patogeni: bacterii, protozoare, drojdii, fungi și alge. Produsul dat este foarte efectiv pentru utilizarea la dezinsecțiile încăperilor pentru animale și păsări, mai ales pentru prelucrarea așternutului, în scopul de a distruge fungii și a preveni așa afecțiuni ca aspergiloza. Datorită acțiunii mecanice nu formează rezistență și poate fi folosit pe perioade lungi.

VAPCOPHORE poate fi folosit și pentru distrugerea virusurilor foarte rezistenți la acțiunea dezinfectanților așa ca: B. Gambora, B. Newcastle și B. Marec.

Nu este coroziv.

Soluția concentrată de VAPCOPHORE nu acționează iritant supra pielei și a mucoaselor.

FOLOSIRE: după dizolvarea în apă în următoarele concentrații:

- | | |
|-----------------|---|
| ▪ 0,5-1 % | Pentru dezinfectarea și curățirea grajdurilor, echipamentului, jgheaburi de hrănire, inventarului, aparatelor de muls, incubatoarelor, și a utilajului de prelucrare. |
| ▪ 0,25 – 0,50 % | Pentru dezinfectarea ouălor de incubație prin scufundare. |
| ▪ 1-2 % | Pentru dezinfectarea covorașelor de dezinsecție |
| ▪ 2-3 % | Pentru controlul epidemiilor (provocate de: Salmonela, B. Gamboro, B. Marec, Bruceloza, B. Newcastle) și în cazurile riscurilor de epidemii. |
| ▪ 1 % | Pentru dezinsecția generală a suprafețelor. |
| ▪ 0,01 % | Pentru sanația apei de băut la păsări și animale mari. |
| ▪ 0,5 % | Pentru spălarea ugerului ca un ajutor în controlul mastites și pentru prelucrarea rănilor ale mameloanelor. (Se aplică imediat după mulsoare și înainte de următoarea mulsoare) |

Măsuri de prim ajutor în caz de:

În caz de ingerare

- Clătiți gura cu apă.
- Se bea 2 pahare de apă .
- NU se induce voma.

În caz de contact cu ochii

- Clătiți imediat cu multă apă, de asemenea, sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute.



7

În caz de contact cu pielea

- Se va spăla imediat cu multă apă.

În caz de inhalare:

- Scoateți persoana la aer curat.
- În caz de dificultati de respirație se administrează oxigen.

Apelați un medic imediat în caz de necesitate.

REMARCĂ:

Toxic pentru pești.

Nu se poate de amestecat cu alte preparate

Nu se aplică pe suprafețele mari ale corpului în cazul leziunilor cutanate pentru a preveni afecțiunile glandei tiroide.

Precauții:

Numai pentru uz veterinar.

A nu se lăsa la îndemina copiilor și a se păstra aparte de produse alimentare.

Evitați contactul cu pielea, ochii, inhalarea și inghițirea produsului.

Păstrare: A se păstra la 10-25 °C la loc uscat și ferit de lumină. A se feri de îngheț.

Termen de valabilitate:

2 ani de la data producerii.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 60 zile.

„A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj ”

În caz de apariție a oricăror reacții adverse, contactați deținătorul certificatului de înregistrare Si/sau Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor”.

Ambalaj: 1 l, 5 l, 20 l

Numele și adresa producătorului: VAPCO, Iordania, or. Amman

Numele și adresa deținătorului autorizației de comercializare: VAPCO, Iordania, or. Amman

Deținătorul certificatului de înregistrare în Republica Moldova: SRL „SUM AGRO Service”, or. Chișinău str. Feredeului 12 tel/fax 022 276 062

