

Fitosept (Unguent mamar)

Descriere:

Masă omogenă semifluidă de culoare galbenă semifluidă cu miros specific

Compoziție:

100 ml conțin:

Tinctură de gălbenele – 20 ml

Ulei de cătină - 5 ml

Exipient (produse apicole, componente de origine vegetală, lanolină și stabilizator pînă la 100 gr.

Acțiune farmacoterapeutică: AT și QD *alte preparate veterinare(QD10A)*

Combinăția componentelor de origine vegetală nu conține antibiotice, hormoni și alte substanțe sintetice. Acționează antiseptic și antiinflamator, activează troficitatea țesuturilor și circulația sanguină, regenerează țesuturile afectate tratează crevassele, protejează pielea de acțiunea negativă a razelor solare, frig și înțepăturile insectelor.

Indicații:

Tratamentul crevaselor, eroziilor, traumelor mameloanelor, bolilor pielii și a mucoaselor, prelucrarea mâinilor operatorului în cazul acordării ajutorului în timpul fătărilor sau manipulațiilor obstetricale, profilaxia mastitelor. Se aplică într-un strat subțire pe uger și se masează ușor.

Mod de administrare și dozaj:

După mulsoare și pentru igienizarea ugerului, unguentul se aplică într-un strat subțire și ușor se masează 1-2 ori pe zi, pînă la dispariția simptomelor de boală. Pe plăgi se aplică cu ajutorul unui tampon sau drenaj la fiecare 24-48 ore.

Contraindicații

Nu sunt.

Mod de prezentare:

Tuburi cu 50, 90, 100 și 150 gr, flacoane de plastic

15. Particularități deosebite la prima administrare : în urma administrării preparatului la animale se înregistrează delir, se acutizează simțul pericolului și agresivitate.
16. Se interzice administrarea preparatului Antimedina , femelelor gestante. Femelelor în lactație, cățelilor și motănașilor , preparatul poate fi administrat în urma unui consult a medicului veterinar.
17. În caz de necesitatea folosirii preparatului la categoriile sus numite, se administrează în același dozaj și conform aceeași scheme.
18. În rare cazuri, în urma administrării, la animale poate apărea delirul, sentimentul pericolului sau agresivitate în perioada inversării. Se recomandă verificarea stării animalelor (se exclude hipotermia, bradicardia, depresia respiratorie și nivelul anesteziei).
19. Nu se recomandă amestecarea preparatului Antimedina, într-o seringă cu alte preparate medicamentoase. Folosirea antagoniștilor receptorilor α_2 -adrenegici împreună cu preparatele anticolinergice sau cu efect cronotrop pozitiv, poate provoca tahicardie în exces.
20. Antimedina nu se recomandă animalelor productive.

IV. Reguli de igienă personală

21. În lucru cu Antimedina se recomandă respectarea regulilor comune de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în timpul lucrului cu preparate medicamentoase.
22. La finisarea lucrului , mâinile se recomandă de spălat cu apă caldă și săpun. Flacoanele deșarte se interzice de a fi folosite în uz casnic, ele se utilizează împreună cu deșeurile menajere.
23. În caz de contact cu pielea sau mucoasele oculare, ele se spală din abundență cu apă.

Persoanelor cu hipersensibilitate la componentele preparatului se recomandă evitarea contactului direct cu Antimedina. În caz de apariție a reacției alergice sau la îngerarea accidentală de către om, se recomandă adresarea cât de repede posibil la o instituție medicală(cu sine de avut eticheta sau instrucțiunea pentru administrare).

Producător: OOO NPO „Api-San”, reg.Moscova, or.Balașiha, ș.Poltevkoe 4
Distribuitor oficial în R.Moldova: SRL”Zoofarmagro”, m.Chișinău,
str.Camenita 4A, tel/fax +373 022 855-071; +373 022 855-073