

**PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR**

Fungin<sup>R</sup> Forte

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

**1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.**

OOO "Apicenna" , 123242, or. Moscova, str. Drujinnikovskaia, 15, et.5, c I, oficiu 532/5  
 89626252752, e [karbysheva@apicenna.ru](mailto:karbysheva@apicenna.ru)

**2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA**

FunginR Forte(Fungin Forte).

Soluție pentru uz extern.

Medicamentul se prezintă ca o soluție de culoare de la galben-pal până la maro deschis.

1 ml conține:

**Substanța activă :**

- Clorhidrat de terbinafină - 10 mg,
- Tiabendazol - 10 mg,
- Metronidazol - 10 mg,
- Clorură de lidocaină-50 mg,
- Dexametazonă fosfat de sodiu-1 mg.

**Excipienți:**

Alcool etilic, dimetilsulfoxid, limonen și polilitenglicol-400.

**3. INDICAȚII TERAPEUTICE**

FunginR Forte se indică câinilor și pisicilor în tratamentul bolilor micotice a pielii, eczemelor de etiologie micotică și dermatite seboreice.

**4. CONTRAINDICAȚII**

Hipersensibilitate sporită la componentele medicamentului.

Nu se administrează animalelor slăbite și tineretului cu vârsta sub 4 săptămâni.



Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor  
MD-2009, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 63  
ÎNREGISTRAREA DE STAT  
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR  
**APROBAT**

## 5. REACȚII ADVERSE

La administrarea conform instrucțiunii, reacții adverse nu apar. În caz de hipersensibilitate individuală la componentele preparatului și apariția iritațiilor, prelucrarea se întrerupe, Fungin<sup>R</sup> Forte se înlătură cu un tampon, suprafața se spală cu apă, animalului i se indică antihistaminice și terapie simptomatică.

## 6. SPECII ȚINTĂ

Câini, pisici.

## 7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

FunginR Forte se aplică în strat subțire cu un tampon, aspersînd sau aplicînd direct pe piele cu picurătorul flaconului, ușor masînd locul afectat de la periferie spre centru și 1 cm de țesut limitrof. Tratamentul se efectuează 1-2 ori pe zi, până la însănătoșire, dar nu mai mult de 15 zile, care se confirmă prin examenul microscopic al pielii.

## 8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

## 9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra în ambalajul închis al producătorului, ferit de raze solare directe, separat de produse alimentare și furaje, la T<sup>0</sup>C de la 0<sup>0</sup>C până la +25<sup>0</sup>C, în locuri inaccesibile copiilor.

## 10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Medicamentul nefolosit se elimină în conformitate cu legislația în vigoare.

Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se elimină cu deșeurile menajere.

## 11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

### Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Pentru evitarea lingerii medicamentului aplicat de pe suprafața afectată, animalului i se îmbracă botniță sau guler de protecție, care se scoate peste 15-20 minute după tratare.

În cazuri severe, adăugător se indică medicamente specifice și simptomatice conform instrucțiunilor.

### Precauții speciale pentru utilizare la animale:

A nu se administra animalelor productive.

Particularități deosebite în acțiunea medicamentului la prima lui administrare sau la anularea lui, nu au fost înregistrate.

În caz de omitere a unei aplicări a medicamentului, se recomandă a fi efectuată procedura în aceeași doză și după aceeași schemă.



**Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:**

În timpul lucrului cu Fungin<sup>R</sup> Forte, e important de respectat regulile comune de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu medicamente de uz veterinar.

La finisarea lucrului mâinile se spală cu apă și săpun.

Persoanelor cu hipesensibilitate se recomandă evitarea contactului direct cu Fungin<sup>R</sup> Forte.

În caz de contact accidental cu pielea sau tunicile mucoase oculare, ele se spală din abundență cu apă. În caz de îngerare sau apariție a reacțiilor alergice e necesar de adresat la o instituție medicală (cu sine de avut eticheta sau prospectul).

**Utilizarea în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:**

Nu se indică animalelor în perioada de gestație și lactație.

**Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:**

Nu se recomandă a fi administrat concomitent cu alte medicamente topice ce conțin hormoni corticosteroidieni.

**Supradozare:**

Nu au fost înregistrate cazuri.

**Incompatibilități:**

În absența studiilor de incompatibilitate, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

**12. PERIODA DE VALABILITATE**

2 ani din data producerii, 30 zile după deschiderea flaconului.

A nu se folosi după expirarea termenului indicat pe ambalaj.

**13. STATUT LEGAL**

Se eliberează fără prescripție veterinară.

**14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR**

Flacoane de sticlă/polimer x 10ml, 12ml, 15ml, 20ml, 30ml, 40ml, 50ml, 100ml.

**15. DATA ULTIMII REVIZUIRI A TEXTULUI**

03.2023

**16. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA**

SRL” Zoofarmagro”, m. Chișinău, str. Camenița 4a

tel/fax +373 022 855-071; tel +373 022 855-073; [zoofarmagro@mail.ru](mailto:zoofarmagro@mail.ru)

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

