

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Fluvalidez

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nementionate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

AO"Agrobioprom",105064, Rusia, or.Moscova, str.Kazakova 6/1
AO"Agrobioprom",143985, reg.Moscova, Balașiha, ș.Poltevscoe 4

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Fluvalidez (*Fluvalidez*).Plăcuță subțire din lemn(furnir) de culoare de la bej deschis la maro, cu miros de uleiuri esențiale.

Denumirea internațională nepatentată: tau-fluvalinat, ulei esențial de levănțică, cimbru, rozmarin.

În calitate de substanțe active 1 plăcuță conține : fluvalinat-80 mg, ulei esențial de levănțică-60 mg, ulei esențial de cimbru-60 mg, ulei esențial de rozmarin-80 mg și adjuvanți: etilceluloză și furnir.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Fluvalidez se indică în combaterea *Varroa destructor* și *Acarapis woodi* la albini.

4. CONTRAINDICAȚII

Se interzice folosirea preparatului mai târziu decât cu 14 zile pînă la începutul culesului, pentru evitarea conținutului de reziduri în miere.

5. REACȚII ADVERSE

La administrarea conform instrucțiunii date, nu apar.

6. SPECII ȚINTĂ

Albini.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Fluvalidez se folosește în perioada de primăvară și toamnă. Preparatul se plasează în stup, în raport de 2 plăcuțe la 10-12 faguri. Pentru familii mici (pînă la 6 faguri), familiile nou formate sau nuclee, este suficient 1 plăcuță care se amplasează în centrul cuibului.

În familiile slabe se folosește 1 plăcuță, între ramele 3 și 4, în cea puternică-una între



ramele 3 și 4, cealaltă între 7 și 8. Se lasă în stup plăcuțele pe un termen de la 3 la 30 zile, în dependență de cantitatea puietului căpăcit.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Mierea se dă în consum uman nu mai devreme decît peste 14 zile după administrarea preparatului.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra în ambalajul închis al producătorului, ferit de raze solare directe, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 0°C+25°C, în accesul copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu legislația în vigoare.

Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Preparatul Fluvalidez nu este toxic pentru albini, în doze recomandate nu oferă efect negativ asupra vitalității și productivității familiei de albini.

12. PERIODA DE VALABILITATE

În ambalaj închis al producătorului - 3 ani din data producerii. După deschidere nu se păstrează. A nu se folosi după expirarea termenului indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează cu prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Pachet ermetic din peliculă metalizată a cîte 10 plăcuțe din furnir.

15. DATA ULTIMII REVIZUIRI A TEXTULUI

10.07.2019

16. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4a

tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru



NUMAI PENTRU UZ VETERINAR