

REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Septo-spray (*Septo-spray*).

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

2.1 Descrierea generală

Preparatul prezintă o soluție transparentă ușor vâscoasă, de culoare brună, cu miros specific de iod.

2.2 Compoziția calitativă și cantitativă

1 ml de preparat conține:

2.2.1 Substanța activă :

Iod-povidonă - 30 mg (echivalent 3 mg iod activ).

2.2.2 Excipienți:

Glicerol, monohidrat de acid citric, fosfat disodic substituit 12-apos și apă purificată.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluție de uz extern.

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1 Specii țintă:

Cabaline, bovine, ovine, caprine, câini, pisici, iepuri și păsări.

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor-țintă

Septo-spray se indică în tratamentul bolilor pielii, a tunicilor mucoase și în dezinfectia câmpului operator la animale.

4.3 Contraindicații:

Sensibilitate individuală sporită la preparate cu conținut de iod. A nu se folosi concomitent cu alte preparate antiseptice și dezinfectante de uz extern.

4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Nu sunt.

4.5 Precauții speciale pentru utilizare

4.5.1 Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Particularități deosebite în acțiunea preparatului la prima lui administrare sau la anularea lui, nu au fost înregistrate.

4.5.2 Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul lucrului cu preparatul Septo-spray, este important de respectat regulile comune de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu preparate farmaceutice.

Persoanelor cu hipersensibilitate se recomandă evitarea contactului direct cu Septo-spray. În caz de contact accidental cu pielea sau tunicile mucoase oculare, ele se spală din abundență cu apă. În caz de îngerare sau apariție a reacțiilor alergice, e necesar de adresat la o instituție medicală (cu sine de avut eticheta sau instrucțiunea).



4.6 Reacții adverse:

La administrare conform instrucțiunii, reacții adverse și complicații nu apar. În caz de apariție a reacție alergice, administrarea se stopează și se indică preparate antihistaminice și terapie simptomatică.

4.7 Utilizarea în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Preparatul Septo-spray se admite în administrare femelelor în gestație și lactație.

4.8 Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

A nu se folosi concomitent cu alte preparate antiseptice și dezinfectante de uz extern.

4.9 Doza și calea de administrare

4.9.1 Doze:

Nu este cazul.

4.9.2 Mod de administrare:

Preparatul Septo-spray se administrează extern, aplicând-ul pe suprafața afectată prin aspersare de la distanța de 10-20 cm până la acoperire vizuală a ei.

În tratamentul rănilor aseptice și infectate, a arsurilor de gradul 1 și 2, a eczemelor și dermatitelor, se aplică de 1-2 ori pe zi, timp de 5-10 zile. La necesitate, în prealabil rana se toaletează.

Tratamentul tunicilor mucoase a cavității bucale și a faringelui, se efectuează prin aspersarea de 2-3 ori pe zi, timp de 5-10 zile. În prealabil, mucoasele se spală cu apă caldă. Timp de 30 minute după prelucrare cu Septo-spray, animalului i se exclude hrana și apa.

Prelucrarea câmpului operator sau a locului injectării se face prin aspersare de la distanța de 10-20 cm până la acoperirea vizuală a suprafeței. Se aplică două straturi, lăsînd precedentul să se usuce.

4.10 Supradozare

La administrare conform instrucțiunii date, simptome de supradozare nu au fost înregistrate. În caz de supradozare, animalului i se indică terapie simptomatică.

4.11 Perioada de așteptare:

Nu este cazul.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăți farmacodinamice:

5.1.1 Grupa farmacoterapeutică: antiseptic, antiinflamator, epitelizant.

Codul ATC: QD08AG02

5.1.2 Mecanism de acțiune

În urma contactului preparatului Septo-spray cu pielea și tunicile mucoase produce distrugerea treptată a complexului iod-povidonă cu degajarea iodului activ, manifestând acțiune antimicrobiană prin oxidarea grupelor proteice active din protoplasma bacteriilor și astfel denaturînd proteinele.

5.1.3 Efecte farmacodinamice

După gradul de impact asupra organismului, preparatul Septo-spray face parte din preparatele puțin toxice (clasa 4 conform GOST 12.1.007-76), în doze recomandate nu posedă acțiune local-resorbțivă sau sensibilizantă.



Iodul este activ față de toate tipurile de microorganisme (bacterii, virusuri, fungi, protozoare) rezistență față de iod - lipsește.

5.1.4 Eficacitate și siguranță clinică:

Se recomandă respectarea termenilor recomandați a administrărilor pentru a nu diminua eficiența terapeutică. În caz de omitere a unei sau mai multor doze, administrarea se reea în aceeași doză conform aceeași scheme. Nu se folosește dozaj dublu în locul celui omis.

5.2 Proprietăți farmacocinetice:

În urma aplicării pe piele, ea se colorează pe scurt timp în galben.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților:

Glicerol, monohidrat de acid citric, fosfat disodic substituit 12-apos și apă purificată.

6.2 Incompatibilități:

În absența studiilor de compatibilitate, acest preparat nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

6.3 Perioada de valabilitate:

18 luni din data producerii, după deschiderea flaconului -60 zile.

6.4 Condiții speciale pentru depozitare:

A se păstra în ambaj închis al producătorului ,la loc uscat, ferit de raze solare directe, separat de produse alimentare și furaje, la T⁰C 0⁰C +25⁰C. În locuri inaccesibile copiilor.

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar

Flacon din polimer a câte 20,50,100 și 250 ml cu pulverizator și sticle din polimer a 500 ml cu capac swift-off.

6.6 Măsurile speciale pentru eliminarea medicamentelor de uz veterinar neutralizate, sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse:

Preparatul nefolosit se utilizează conform reglementării locale, ambalajele se utilizează cu deșeurile menajere.

7. DEȚINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

OOO" NITA-FARM", 410010, or. Saratov, str. Osipova V.I. 1

str. Țentralinaia 1. Tel/fax +7(4852)338-600

e-mail: client@nita-farm.ru

8. NUMĂRUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

200074

9. DATA PRIMEI ELIBERĂRI A CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

02/07/2020

10. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

16.06.2016

