

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

VERMICID 10
100 mg /ml suspensie orală pentru bovine și ovine

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect.

Suplimentar pentru medicamentul de uz veterinar disponibil numai cu prescripție veterinară:

- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

SC DELOS IMPEX '96 SRL, Str. Horia, Cloșca și Crișan, nr. 81, Otopeni, jud. Ilfov, Romania.
Tel: 0372.714.433, Fax: 0372.714.460.
E-mail: office@delosmedica.ro.

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

VERMICID 10 este o suspensie de culoare albă ce conține per 1 ml:

Substanța activă:

Albendazol 100 mg

Excipienți:

Acid benzoic 8 mg

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Vermicid 10% este un antihelmintic cu spectru larg, utilizat în tratamentul și controlul infestațiilor cu următoarele tipuri de helminți, la bovine și ovine:



Parazitoza	Bovine	Ovine
Parazitoze hepatice determinate de forme adulte de trematode	<i>Fasciola hepatica</i> , <i>Dicrocoelium lanceolatum</i>	<i>Fasciola hepatica</i> , <i>Dicrocoelium lanceolatum</i>
Cestodoze	<i>Moniezia benedeni</i> , <i>M. expansa</i>	<i>Moniezia expansa</i>
Parazitoze gastrice determinate de larve (L4) și nematode adulte	<i>Ostertagia ostertagi</i> (inclusiv larvele L4 inhibate), <i>Haemonchus contortus</i> , <i>Trichostrongylus axei</i>	<i>Ostertagia circumcincta</i> , <i>Haemonchus contortus</i> , <i>Trichostrongylus axei</i>
Parazitoze intestinale determinate de larve (L4) și nematode adulte	<i>Nematodirus spathiger</i> , <i>Cooperia oncophora</i>	<i>Nematodirus spathiger</i> , <i>N. filicolis</i> , <i>Cooperia oncophora</i> , <i>Trichostrongylus colubriformis</i> , <i>Oesophagostomum columbianum</i> , <i>Chabertia ovina</i>
Parazitoze intestinale determinate de nematode adulte	<i>Bunostomum phlebotomum</i> , <i>Trichostrongylus colubriformis</i> , <i>Oesophagostomum radiatum</i>	
Parazitoze pulmonare determinate de larve și nematode adulte	<i>Dictiocaulus viviparus</i>	<i>Dictiocaulus filaria</i>

În scop profilactic se fac 3-4 administrări/an: înainte de ieșire la pășunat, în lunile iulie și septembrie și după intrare în stabulație.

4. CONTRAINDICAȚII

Nu se administrează la animalele cu hipersensibilitate cunoscută la albendazol sau la excipienții produsului.

5. REACȚII ADVERSE

Nu sunt.

6. SPECII ȚINTĂ

Bovine și ovine.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Pentru a administra doza corectă, greutatea corporală trebuie determinată cât mai exact; se va verifica, de asemenea, precizia instrumentului de dozat.



Produsul se administrează pe cale orală cu pistolul dozator sau seringă astfel:

Speciile de helminți	Doza (bovine și ovine)
<i>Nematodirus spathiger</i> , <i>N. filicolis</i> , <i>Cooperia oncophora</i> , <i>Trichostrongylus colubriformis</i> , <i>Oesophagostomum columbianum</i> , <i>Ostertagia circumcincta</i> , <i>Bunostomum phlebotomum</i> , <i>Trichostrongylus colubriformis</i> , <i>Oesophagostomum radiatum</i> , <i>Haemonchus contortus</i> , <i>Trichostrongylus axei</i> , <i>Chabertia ovina</i> , <i>Dictiocaulus filaria</i> , <i>Dictiocaulus viviparus</i> <i>Moniezia benedeni</i> , <i>M. expansa</i>	1,5 – 3 ml /40 kg greutate vie
<i>Fasciola hepatica</i> , <i>Dicrocoelium lanceolatum</i>	3 – 4 ml/40 kg greutate vie

În scop profilactic se fac 3-4 administrări/an: înainte de ieșire la pășunat, în lunile iulie și septembrie și după intrare în stabulație.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Este recomandabil ca dehelmintizările să se inițieze după efectuarea examenelor coproparazitologice, coroborate cu examenele clinice. Dacă acest lucru nu este posibil, tratamentul trebuie să se efectueze pe baza informațiilor epidemiologice locale (fermă, regiune).

Se va acorda atenție la modul de administrare prin breuvaj pentru a evita accidentele (încercare, pneumonie ab-ingestis etc).

Produsul trebuie agitat înainte de administrare.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Carne și organe:

Bovine: 28 de zile

Ovine: 4 zile

Lapte: 3 zile

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna sau vazul copiilor copiilor!

A se păstra în ambalajul original, la temperaturi mai mici de 25°C, ferit de umiditate și lumina solară directă.

A se feri de îngheț.

Inchideți bine flaconul după fiecare utilizare.

A nu se folosi după data de expirare menționată pe etichetă.



10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Pentru protecția mediului, produsul nu trebuie aruncat în ape reziduale sau în resturile menajere ci în locuri special amenajate. Orice produs farmaceutic veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Nu se utilizează la animalele cu hipersensibilitate cunoscută la albandazol sau la oricare dintre excipienți.

Se va acorda atenție la modul de administrare prin breuvaj pentru a evita accidentele (încercare, pneumonie ab-ingestis etc).

Produsul trebuie agitat înainte de administrare.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la benzimidazol sau la excipienții produsului trebuie să evite contactul cu produsul.

Pentru a se preveni orice efecte neplăcute, la manipularea produsului, se recomandă purtarea mănușilor din cauciuc și a ochelarilor de protecție.

În caz de ingestie accidentală a produsului sau dacă apar simptome caracterizate prin prurit cutanat sau iritații ale pielii adresați-vă imediat medicului și arătați-i prospectul produsului sau eticheta. Manifestările serioase, de tipul: umflarea feței, buzelor sau pleoapelor însoțite de dificultăți ale respirației, necesită asistență medicală de urgență.

Nu se administrează în prima perioadă a gestației.

În caz de supradozare pot apărea fenomene de intoleranță, mai ales digestivă, manifestate prin vomă, diaree, colici, tenesme etc. Se instituie tratamentul simptomatic.

Administrarea de doze mult mai mari decât cele recomandate în prospect și pe o perioadă mai îndelungată poate determina apariția efectelor toxice asupra parenchimului hepatic.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează în baza prescripției veterinare.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacoane din polietilena de înaltă densitate ce conțin 100, 500, 1000 ml și bidoane din polietilena de înaltă densitate ce conțin 5, 10, 20 litri.

Ambalaj secundar: cutie de carton x 20 flacoane x 500 ml, cutie de carton x 12 flacoane x 1 litru

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

Februarie 2012.



Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
MD-2009, mun.Chșișinău, str.M.Kogălniceanu, 63

ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR

APROBAT

IMPORTATOR PENTRU REPUBLICA MOLDOVA
NUTRITFARM SRL

tel./fax: 022 890 404 GSM: 079518904

e-mail: nutritfarm@yahoo.com office@nutritfarm.md

www.nutritfarm.md

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

