



## PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

FOLLIMAG® 200 UI

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.
- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

### 1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Mosagrogen SA, Rusia

г. Москва, проезд Дорожный 1-й, дом 1, строение 1.

telefon +7(495)744-0645; fax+7(495)744-0645

e-mail: mag@mosagrogen.ru

### 2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Follimag® 200 UI

Denumire internațională nepatentată: Gonadotropina.

Iml conține:

**Substanța activă:**

Gonadotropina serică ecvină - 200 UI

**Lista excipienților:**

Glicină, fosfat de monopotasiu, fosfat disodic

Liofilizat pentru soluție injectabilă.

### 3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Follimag®200 UI este prescris pentru a stimula căldurile la bovine, ovine, porcine, animale de blană și pentru a trata hipofuncția ovariană la vaci.



#### **4. CONTRAINDICAȚII**

Nu se administrează la animale cu hipersensibilitate individuală crescută la componentele medicamentului.

Este interzisă administrarea medicamentului la animalele slăbite, gestante și imature.

#### **5. REACȚII ADVERSE**

În cazul manifestării semnelor de reacție anafilactică, animalelor li se administrează imediat adrenolitice și / sau antihistaminice în conformitate cu instrucțiunile de utilizare a acestora.

#### **6. SPECII ȚINTĂ**

Bovine, ovine, porcine, animale de blană.

#### **7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ**

Prepararea soluției pentru administrare:

Conținutul flaconului se dizolvă în 3ml de solvent: soluție fiziologică sterilă sau apă pentru injecții. (Nu se permite utilizarea soluției care formează fulgi insolubili sau sediment la dizolvare). Soluția preparată trebuie păstrată la frigider și utilizată în decurs de 12 ore.

*Pentru a stimula căldurile și a crește fertilitatea, medicamentul se administrează o dată:*

- Vaci: Intramuscular în zona coapsei, în doze de 500 - 600 UI per animal.

Dacă nu există nicio manifestare de călduri pronunțate sau inseminare infertilă, medicamentul trebuie administrat repetat în aceeași doză peste 21 - 23 de zile după examinarea ginecologică preliminară a animalelor;

- Scroafe: Intramuscular în doză de 500-600 UI per animal peste 24 de ore după înțărirea purceilor;

- Animalele de blană: Subcutanat în partea interioară a coapsei în doză de 50 - 60 UI per animal, Medicamentul se administrează în perioada în care femelele sunt în călduri, capabile de a se împerechea, și masculii manifestă activitate sexuală.

*Pentru tratamentul hipofunției ovariene la vaci:*

Follimag® 200 UI se administrează intramuscular în doză 900 - 1000 UI per animal.

*Cu scopul creșterii activității sexuale:*

- Berbecilor și vierilor medicamentul se administrează subcutanat în partea interioară a coapsei de două ori cu un interval de 3-4 zile, în doză de 600 - 800 UI și respectiv 1000 - 1200 UI per animal.

#### **8. PERIOADA DE AȘTEPTARE**

Zero Zile.



## **9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE**

A se păstra medicamentul într-un loc protejat de lumina directă a soarelui, separat de alimente și furaje, la o temperatură cuprinsă între 2 ° C și 10 ° C.

Medicamentul nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor.

## **10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR**

Medicamentul neutilizat este eliminat în conformitate cu cerințele locale legale.

## **11. ATENȚIONĂRI SPECIALE**

### **Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:**

Medicamentul este utilizat, de regulă, o singură dată.

Particularitățile acțiunii medicamentului la prima utilizare și la retragerea lui nu au fost stabilite.

### **Precauții speciale pentru utilizare la animale:**

Nu sunt.

### **Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:**

În timpul manipulării medicamentului, să recomandă respectarea regulilor generale de igienă personală și a măsurilor de siguranță, prevăzute în timpul lucrului cu medicamente.

Nu mâncați, nu consumați băuturi și nu fumați în timp ce manipulați medicamentul.

La finisarea lucrului, mâinile trebuie spălate cu apă caldă și săpun.

Flacoanele goale a medicamentului sunt interzise pentru utilizare în scopuri casnice, ele trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere.

În caz de contact accidental al medicamentului cu pielea sau membranele mucoase ale ochilor, acestea trebuie clătite cu multă apă.

Persoanele cu hipersensibilitate la componentele medicamentului trebuie să evite contactul direct cu Follimag® 200 UI.

În caz de reacții alergice sau ingestie accidentală a medicamentului în organismul uman, trebuie să contactați imediat o instituție medicală (ar trebui să aveți prospectul de utilizare a medicamentului sau eticheta).

### **Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:**

Este interzisă utilizarea medicamentului Follimag® 200 UI pentru animalele gestante.

### **Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:**

Nu se cunosc.

### **Supradozare**

Nu se cunosc.





## **12. PERIOADA DE VALABILITATE**

Perioada de valabilitate a medicamentului de uz veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 24 luni.

Perioada de valabilitate după reconstituire conform instrucțiunilor: 12 ore.

Nu utilizați medicamentul după data de expirare.

## **13. STATUT LEGAL**

Se eliberează cu prescripție veterinară

## **14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR**

Flacoane de sticlă cu capacitatea de 8, 10, 20 ml, sigilate cu dopuri de cauciuc, acoperite cu capace din aluminiu. Flacoanele sunt plasate în cutii a câte 20. Fiecare cutie este furnizată cu prospect de utilizare.

## **15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI**

07/2021

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

