

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR**IODOPEN^R**

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.
- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

OOO "NITA-FARM", Rusia
410010, or. Saratov, str. Osipova V.I. 1
Tel/fax +7(4852)338-600;
e-mail: client@nita-farm.ru

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Iodopen^R (Iodopen^R).

Denumirea internațională nepatentată : iod-povidonă.

Supozitoriu intrauterin de culoare brună, formă cilindrică sau elipsoidă, consistență dură și miros slab de iod.

1 supozitoriu (10 g) conține:

Substanța activă:

1,5 g de iod-povidonă (1,57% de iod activ) și adjuvanți.

Excipienți:

Hidrocarbonat de sodiu, PEG-1500, stearat de calciu, acid fumaric și lactoză.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Iodopen^R se indică vacilor și scroafelor în profilaxia și tratamentul endometritei acute postpartum și alte procese inflamatorii de etiologie bacteriană a uterului după fătări laborioase sau cu complicații, după extragerea manuală a învelitorilor fetale sau a avorturilor.

4. CONTRAINDICAȚII

Hipertireoză, sensibilitate individuală sporită la iod (inclusiv în anamneză) și alte componente a medicamentului.





5. REACȚII ADVERSE

La administrare conform prospectul de utilizare, reacții adverse și complicații nu apar. În rare cazuri animalele pot manifesta reacție locală sub formă de prurit și hiperimie a organelor genitale externe care trec de la sine dacă se stopează administrarea medicamentului.

6. SPECII ȚINTĂ

Bovine, porcine.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Doze: câte 1 supozitoriu intrauterin.

Înainte de administrarea Iodopen^R-ului se efectuează sanarea organelor genitale externe și a rădăcinii cozii.

Iodopen^R se administrează manual, i/uterin, câte un supozitoriu:

- în scop curativ de două ori cu interval de 24-48 ore,
- în scop preventiv o singură dată după înlăturarea învelitorilor fetale, avort sau parturiție.

La necesitate cura de tratament se repetă.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Carne-0 zile; laptele obținut timp de primele 24 de ore, se dă în hrana animalelor după fierbere, în consumul oamenilor – după 24 ore de la ultima administrare.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra în ambalajul închis al producătorului, ferit de raze solare directe, separat de produse alimentare și furaje, la T⁰C + 4⁰C+25⁰C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Medicamentul nefolosit se utilizează conform reglementării locale, ambalajele se utilizează cu deșeurile menajere. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Se recomandă respectarea termenilor recomandați a administrărilor pentru a nu diminua eficiența terapeutică. În caz de omitere a unei sau mai multor doze, administrarea se reea în aceeași doză conform aceeași scheme. Nu se folosește dozaj dublu în locul celui omis.

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Particularități deosebite în acțiunea medicamentului la prima lui administrare sau la anularea lui, nu au fost înregistrate. În prealabil se sanează organele genitale externe și rădăcina cozii. A nu se administra două supozitoare concomitent.



