

APROBAT

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

**INSEKTOSTOP
 pentru câini și pisici**

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect.
- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

SRL «NPP «SUZIRYA», Ucraina, or. Harkov, 61093, str. Poltavskii șleah, 115

SRL «NPP «SUZIRYA», Ucraina, or. Harkov, 61105, str. Zernovaia, 4

tel.: +38 (057) 766-36-36

office@priroda.ua

priroda.ua

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA.

INSEKTOSTOP pentru câini și pisici

Picături de uz extern, aplicare cutanată.

Lichid uleios transparent cu un miros specific.

Substanță activă:

Fipronil – 100 mg

Excipienți:

polietilenglicol-400;

alcool izopropilic;

N-metilpirolidonă.





3. INDICAȚII TERAPEUTICE (pe specii țintă)

Tratamentul și prevenirea infestațiilor cu ectoparaziți: purici (*Ctenocephalides* spp.), păduchi (*Linognathus setosus*) în toate stadiile de dezvoltare, păduchi hematofagi (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*), căpușe (*Ixodes* spp., *Dermacentor* spp., *Rhipicephalus* spp., *Haemaphysalis* spp., *Boophilus calcaratus*) la câini și pisici.

Tratamentul câinilor și pisicilor infestate cu căpușe sarcoptiforme (*Otodectes cynotis*, *Sarcoptes scabiei* var. *canis*, *Notoedres cati*, *Cheyletiella* spp.), căpușe trombidiforme (*Demodex canis*).

4. CONTRAINDICAȚII

- A nu se administra animalelor bolnave, epuizate și slăbite!
- A nu se administra la animale cu vârsta sub 10 săptămâni!
- A nu se administra la animale cu sensibilitate la fipronil.

5. REACȚII ADVERSE

Administrarea medicamentului la animale cu sensibilitate sporită la fipronil poate provoca iritații ale pielii, mâncărimi de scurtă durată și vomă. Aceste semne dispar în scurt timp fără tratament.

6. SPECII ȚINTĂ

Câini, pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZĂ PRESCRISĂ

Medicamentul se aplică extern direct pe piele cu ajutorul unei pipete în locuri inaccesibile pentru lins: regiunea greabănului, de-a lungul șirei spinării, în caz de infestare cu acarieni de urechi – pe pielea auriculei.

În cazuri de otodectoză la animale, interiorul pavilionului auricular și canalul auditiv extern se curăță de cerumen, cruste și exudat, după care medicamentul se aplică la ambele urechi, chiar dacă doar una este afectată. Pentru distribuirea uniformă a medicamentului, pliați auriculul în jumătate și masați ușor. În caz de necesitate, după 7-10 zile, cursul tratamentului se repetă sub controlul examenului microscopic al raclajului.

În cazuri de sarcoptoză, notoedroză, demodicoză și heiletioză medicamentul se administrează de 2-4 ori la un interval de 7-10 zile. Se recomandă efectuarea unui tratament complex etiologic, patogenetic și simptomatic.

O singură aplicare previne infestarea cu căpușe pe o perioadă de 3 săptămâni și pe o perioadă de 4 săptămâni infestarea cu purici.

Pentru a evita re-infestarea animalelor cu ectoparaziți, prelucrați periodic așternuturile animalelor cu medicamentul insecticide.

Doze pentru specii țintă

- pisici cu o greutate corporală între 3 și 10 kg - 0,8 ml de medicament (1 pipetă) per un animal;





- câini:

<i>Câini, greutatea corporală, kg</i>	<i>Doza preparatului, ml</i>	<i>Cantitatea pipetelor, buc.</i>
3-10 kg	0,8	1
10-20 kg	1,6	2
20-40 kg	2,4	3
peste 40 kg	3,2	4

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc uscat și întunecat, separat de alimente și furaje, inaccesibil copiilor și animalelor, la o temperatură de 4°C - 25°C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Medicamentul neutilizat sau cu termen expirat este eliminat în conformitate cu legislația în vigoare.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă

A nu admite contactul cu ochii și membranele mucoase ale animalelor.

Precauții speciale pentru utilizare

A nu admite contactul cu ochii și membranele mucoase ale animalelor, precum și administrarea pe cale orală.

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

În cazul apariției unor reacții adverse rezultate în urma administrării acestui preparat, stopați administrarea ulterioară a produsului și consultați medicul veterinar.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Respectați principalele reguli de igienă și măsurile de securitate când lucrați cu medicamente de uz veterinar. După aplicarea medicamentului nu permiteți copiilor să se joace cu animalul tratat sau să-l mângâie până la uscarea completă a blănii.

În caz de contact accidental cu pielea sau mucoasele, imediat clătiți cu apă din abundență. Folosiți mănuși de cauciuc în timpul tratamentului animalului.

După ce ați manipulat produsul, spălați-vă bine pe mâini cu săpun.





Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat

Administrarea medicamentului animalelor gestante sau celor lactante trebuie să se bazeze pe o evaluare a riscului și a necesității tratamentului de către un medic veterinar.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiuni:

A nu se administra concomitent cu alte medicamente insecto-acaricide.

Supradozare

Animalele tolerează bine fipronilul în doză terapeutică. Doza care depășește doza terapeutică de 5 ori, nu provoacă semne clinice de otrăvire. Antidot – sulfat de atropină.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

36 (XXXVI) luni.

13. STATUT LEGAL

Să eliberează fără prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Pipete polimerice din folie din PVC x 0,8 ml.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

12.2021

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

