





## 5. REACȚII ADVERSE

Efecte secundare și complicații la utilizarea Cistotel Plus zgarda în conformitate cu prospectul de utilizare, de regulă, nu sunt observate.

În cazul hipersensibilității individuale a animalului la diazinon, sunt posibile hipersalivație, lăcrimare, semne de iritare a pielii. În așa caz zgarda se scoate, animalul se spală cu sapon, blana se clătește bine cu apă curgătoare; la necesitate se indică medicamente antihistaminice și simptomatice.

## 6. SPECII ȚINTĂ

Pisici și câini.

## 7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

După deschiderea ambalajului, zgarda se desface și se atașează pe animal, ajustând dimensiunea astfel încât să existe un spațiu de 1,0-1,5 cm între gâtul animalului și zgardă, apoi este fixată cu cataramă și excesul de bandă este tăiat.

Pentru a atinge efectul maxim se recomandă de a atașa zgarda pe animal cu 2-3 zile înainte de contactare presupusă cu paraziți.

În cazul gradului înalt de infestare se recomandă, înainte de aplicare a zgărzii, ca animalul să fie spălat cu șampon insecticid, iar așternuturile animalelor se prelucrează cu un insecticid în conformitate cu prospectul de utilizare.

## 8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

## 9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra în ambalajul original închis, la loc uscat, protejat de acțiunea directă a razelor solare, separat de alimente și furaje, la temperaturi de la 0°C pînă la 30°C.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

## 10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Medicamentul neutilizat este eliminat în conformitate cu cerințele legislației.

Ambalajele goale a medicamentului sunt interzise pentru folosire în uz casnic, sunt supuse eliminării cu deșeurile menajere.

## 11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

**Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:**

Nu este destinat utilizării la animale productive.



**Precauții speciale pentru utilizare la animale:**

Particularitățile acțiunii la începutul purtării zgarzii și în caz de scoatere a zgardei nu sunt stabilite. Trebuie de evitat încălcările regimului utilizării zgarzii, deoarece aceasta poate duce la o scădere a eficienței.

**Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:**

În timpul manipulării Cistotel Plus zgardă, trebuie să respectați regulile generale de igienă personală și măsurile de siguranță, prevăzute în timpul lucrului cu medicamente.

Nu fumați și consumați alimente sau băuturi în timpul aplicării.

La finisarea lucrului, mâinile trebuie spălate cu apă caldă și săpun.

Animalelor care poartă această zgardă nu trebuie să fie permis contactul cu copii, în special a sugarilor.

În cazul contactului accidental al medicamentului cu pielea sau membranele mucoase ale ochilor, acestea trebuie spălate cu multă apă.

Persoanele cu hipersensibilitate la componentele medicamentului trebuie să evite contactul direct cu Cistotel Plus zgardă.

În caz de reacție alergică sau în caz de ingestie accidentală, trebuie imediat de contactat o instituție medicală (să prezentați prospectul de utilizare a medicamentului sau eticheta).

**Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:**

Se interzice utilizarea zgarzii femelelor gestante și lactante.

**Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:**

Nu utilizați simultan cu alte medicamente insectoacaricide.

**Supradozare**

Simptome de supradozare nu au fost observate.

**12. PERIOADA DE VALABILITATE**

Termenul de valabilitate este 3 ani de la data producerii.

Este interzisă utilizarea Cistotel Plus zgardă după data de expirare.

**13. STATUT LEGAL**

Se eliberează fără prescripție veterinară

**11. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR**

Termenul de valabilitate este 3 ani de la data producerii.

Este interzisă utilizarea Cistotel Plus zgarda după data de expirare.

**15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI**

12.2021

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

