

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

ALEZAN

cremă pentru articulații

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

Producătorul: OOO „AVZ S-P”, 141300, Federația Rusă, reg. Moscova, or. Serghiev Posad, str. Tsentralnaia 1

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Alezan cremă pentru articulații (*Alezan cream for joints*).

1 g de medicament conține:

Substanțe active:

- Glucozamină hidroclohid (*Glucosamine hydrochloride*) – 10 mg,
- Extract de pasiflora (*Harpagophytum procumbens Extract*) – 5 mg,
- Extract din conuri de pin (*Pinus sylvestris Extract*) – 5 mg,
- Extract din frunze de pelin (*Artemisia vulgaris Extract*) – 3,7 mg,
- Extract din fructe de fenicul (*Foeniculum vulgare Extract*) – 3 mg,
- Extract din scoarță de lemn-dulce (*Glycyrrhiza glabra Extract*) – 2,5 mg,
- Extract din frunze de mentă (*Mentha piperita Leaf Extract*) – 1,6 mg,
- Extract din frunze de cimbrisor (*Thymus serpyllum Extract*) – 1,5 mg,
- Extract din flori de gălbenele (*Calendula officinalis Flower Extract*) – 0,5 mg,
- Extract de coada-șoaricelului (*Achillea millefolium Extract*) – 0,5 mg,
- Extract din frunze de sunătoare (*Hypericum perforatum Extract*) – 0,5 mg,
- Extract din flori de romaniță (*Matricaria chamomilla Flower Extract*) – 0,4 mg,
- Extract din fructe de chimion (*Carum carvi Extract*) – 0,3 mg,
- Extract din fructe de măcieș (*Roza canina Extract*) – 0,3 mg,
- Extract din frunze de rostopască (*Chelidonium majus Extract*) – 0,2 mg



Excipienți: ulei de măsline, glicerol, PEG 8 stearat, hidrolizat de colagen, mumiyo, hidroxid de sodiu, fenoxietanol, ethylhexyglycerol, carbomer și apă purificată.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Alezan cremă pentru articulații se indică la cabaline și câini, în tratamentele complexe a proceselor degenerativ-distrofice acute și cronice a aparatului locomotor în formă localizată, inclusiv osteohondroză, artrite, sinovite și bursite, în timpul acutizării bolilor cronice a articulațiilor și legamentelor, pentru diminuarea procesului inflamator în cazul eforturilor fizice sporite, contuziilor (năsăditurilor), hematoamelor, miozitelor, luxațiilor și ruptura ligamentelor.

4. CONTRAINDICAȚII

Sensibilitate individuală sporită la componentele medicamentului.
A nu se administra pe pielea cu leziuni sau pe tunicile mucoase.

5. REACȚII ADVERSE

La administrare conform instrucțiunii date reacții adverse și complicații nu apar.
În caz de sensibilitate sporită și apariția reacției alergice se stopează aplicarea și se indică antihistaminice și terapie simptomatică.

6. SPECII ȚINTĂ

Cabaline, câini.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Alezan crema pentru articulații se folosește extern, topic, de 2-3 ori pe zi, aplicând în strat subțire, pe pielea intactă, curățată de impurități și uscată, masând ușor pînă la absorbție totală. Câinilor cu blană lungă, în prealabil, suprafața supusă aplicării se tunde.

Procedura se efectuează pe parcursul a 15-30 de zile. Cura se reia peste 10 zile și se repetă în funcție de necesitate. Durata și numărul curelor de tratament depind de severitatea bolii și este determinată de medicul veterinar. Pentru un rezultat mai pronunțat și de lungă durată după aplicarea Alezan cremă pentru articulații se aplică un pansament impermeabil.

După aplicarea medicamentului Alezan cremă pentru articulații, animalul se izolează și nu se deranjează timp de 20-30 de minute. A nu se permite lingerea medicamentului de pe suprafața prelucrată, pînă la absorbția totală a acestuia.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

0 zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra închis în ambalaj original de la producător, la loc întunecos, separat de produse alimentare și hrană pentru animale, la T°C de la +5°C pînă +25°C, în locuri inaccesibile copiilor.



10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Medicamentul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

La câinii cu blană lungă, părul de pe locul aplicării se va tunde.

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Particularități de acțiune a medicamentului la prima administrare și la întreruperea lui nu s-au stabilit.

Se va evita omiterea aplicării medicamentului, deoarece eficacitatea medicamentului se poate reduce. În cazul omiterii unei aplicări planificate, utilizarea este reluată în aceeași doză și conform aceeași scheme.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul lucrului cu medicamentul Alezan cremă pentru articulații e necesar de respectat regulile comune de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu medicamente de uz veterinar. Persoanelor hipersensibile la componentele medicamentului li se recomandă evitarea contactului direct cu Alezan cremă pentru articulații. În caz de contact accidental a medicamentului cu pielea sau tunicile mucoase oftalmice, ele se spală din abundență cu apă.

În caz de apariție a reacției alergice sau la ngerare, e important de adresat la o instituție medicală cât de repede posibil (cu sine de avut eticheta sau prospectul).

În timpul lucrului se interzice fumatul, consumul de alimente și băuturi.

La finisarea lucrului mâinile se spală cu apă și săpun.

Utilizarea în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat

Se permite a folosi la femele gestante și în lactație.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu sunt date.

Supradozare

Nu au fost cazuri înregistrate.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

18 luni din data producerii.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescripție veterinară.



Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
MD-2009, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 63

ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR

APROBAT

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Se produce ambalat în flacoane din polimer cu dozator a câte 100, 250, 500 și 750 ml;
în tuburi de polimer cu capac filetat a câte 100, 200 și 250 ml.

Ambalajele de 100 g sunt plasate în cutii din carton.

15. DATA ULTIMII REVIZUIRI A TEXTULUI

02.2022

16. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m. Chișinău, str. Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru



NUMAI PENTRU UZ VETERINAR