

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR**EXTRAZOL® M**

Spray cutanat

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Deținătorul certificatului de înregistrare:

ООО "Научно-производственная компания „КИН”

04050, or. Kiev, str. Melnikova, 12

Ucraina

Producător:

ООО "БАТАТА"

09106, reg. Kievskaia, or. Belaia Țercovi, str. Tarascianskaia, 197

Ucraina

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

EXTRAZOL® M

Emulsie pentru uz extern sub formă de spray cutanat.

100 g de EXTRAZOL® M conține:

Substanța(e) activă(e):

Deltametrin (tehnic, 98%) – 0,02 g (0,020%),

Esbiotrin (tehnic, 93%) – 0,17 g (0,170%),

Tetrametrin (tehnic, 98%) – 0,038 g (0,038%).

Excipienți: Monoclorometan, surfactanți, solvent Exold D-80 (sau analog), butilhidroxitoluen, propulsor de hidrocarburi, apă deionizată.



3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Profilaxia și tratamentul câinilor și pisicilor în caz de infestare cu ectoparaziți: purici (*Ctenocephalus spp.*, *Pulex irritans*), păduchi malofagi (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostatus*), căpușe (*Dermacentor spp.*, *Rhipicephalus spp.*, *Ixodes spp.*, *Hyalomma spp.*, *Haemaphysalis spp.*, *Boophilus calcaratus*) și păduchi hematofagi (*Linognathus setosys*) la toate etapele de dezvoltare.

Medicamentul este eficient în tratamentul scabiei și otodectozei (*Otodectes spp.*).

4. CONTRAINDICAȚII

Nu se administrează pisoilor cu vârsta sub 12 săptămâni și cățelilor cu vârsta sub 10 săptămâni.

Nu se recomandă administrarea medicamentului animalelor istovite, bătrâne, în perioada de gestație și lactație.

Nu se administrează animalelor în ultimul trimestru de gestație și în perioada estrului.

5. REACȚII ADVERSE

Nu s-au identificat.

6. SPECII ȚINTĂ

Câini, pisici

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Înainte de pulverizare, agitați bine flaconul. Scoateți capacul.

La animale: EXTRAZOL® M se aplică extern, direct pe piele, în locuri inaccessibile pentru lins:

La câini – greabănul și de-a lungul coloanei vertebrale,

La pisici – după ceafă și pe suprafața interioară a auriculei.

Tratamentul se efectuează de 2-3 ori la interval de 10-12 zile.

Doze: Durata pulverizării la un decimetru de piele sau blană a animalului constituie 5-7 secunde.

Câini: 2-10 kg greutate corporală – 1,0 ml de medicament, extern (2 pufuri*)

10-20 kg greutate corporală – 2,0 ml de medicament, extern (4 pufuri)

20-40 kg greutate corporală – 3,0 ml de medicament, extern (6 pufuri)

Peste 40 kg greutate corporală - 4,0 ml de medicament, extern (8 pufuri)

Pisici: 1,0 ml de medicament, extern (2 pufuri)

Căței și pisoii: 0,5 ml de medicament, extern (1 puf)

* Un puf reprezintă o apăsare pe capul pulverizator al flaconului cu durata de 1 secundă.

Efectul profilactic va dura 1,5 – 2 luni. La expirarea acestui termen, tratamentul se poate repeta, la necesitate.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra separat de produsele alimentare, în locuri uscate, bine ventilate, la temperaturi de la +5 °C până la +30 °C.



10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Medicamentul neutilizat se va elimina în conformitate cu reglementările locale în vigoare.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul tratamentului a câinilor și pisicilor, este necesară utilizarea mijloacelor individuale de protecție (mănuși de protecție, halate, ochelari de protecție etc.) și evitarea contactului direct al medicamentului cu pielea sau ochii.

După prelucrarea animalelor trebuie de spălat mâinile cu săpun.

Se interzice de spălat și de mângâiat animalele timp de 48 ore după prelucrare.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Nu se administrează animalelor în ultimul trimestru de gestație și în perioada estrului.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Se permite administrarea concomitentă cu alte medicamente de uz veterinar.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi, dacă este cazul):

La respectarea dozelor recomandate nu s-au observat semne clinice de supradozaj.

Incompatibilități:

Nu se cunosc.

Clasa de toxicitate – 4.

Toxic! Inflamabil! Nu conține freoni!

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate - 3 ani.

A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacoane de metal cu cap pulverizator de 300 ml, ambalate în palet din carton a câte 12 buc. și acoperite cu peliculă de polietilenă.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

05/2022

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

