

Aneks nr. 2

Agencia Națională pentru Siguranța Alimentelor
MD-2009, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Metristar

Suspensie pentru administrarea intrauterine

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.
- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Întreprinderea Particulară „O.L. KAR-AgroZooVet-Service”

str. Eroilor Maidanului, 272B, or. Șargorod, reg. Vinița, 23500, Ucraina

tel. / fax: (0432) 55-14-28, (0432) 55-14-27

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Metristar

Suspensie pentru administrarea intrauterine

1 tub de seringă (19 g) conține

Substanță activă:

Cefapirin benzatine - 500 mg.

Lista excipienților:

Polioxil - 20, polioxil - 12, alcool benzilic, ulei de ricin, kolisolv MST70.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE (pe specii țintă)

În tratamentul vacilor cu endometrită subacută și cronică (nu mai devreme de 14 zile după fătare) cauzată de microorganisme sensibile la cefapirină.

4. CONTRAINDICAȚII

A nu se utiliza mai devreme de 14 zile de la fătare.

A nu se administra animalelor cu hipersensibilitate la cefalosporine.

A nu se administra cu antibiotice din alte grupuri.

A nu se utiliza la animalele gestante.





5. REACȚII ADVERSE

Nu sunt.

6. SPECII ȚINTĂ

Bovine (vacii).

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Intrauterin, folosind un cateter de unică folosință, se administrează conținutul unui tub de seringă, care, de regulă, este suficient pentru vindecarea completă a animalului.

Pentru aceasta, tubul seringii este conectat la cateter, se fixează colul uterin cu mâna, fixat prin rect, cateterul racordat la seringă este introdus cu atenție prin cervix în uter, se administrează conținutul prin apăsarea pistonului seringi. Dacă este necesar, repetați procedura după 48 de ore.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Carne - 24 ore de la ultima administrare

Lapte – zero ore.

În cazul sacrificării forțate a animalelor, carnea poate fi folosită în hrana animalelor neproductive sau se elimină, în conformitate cu concluzia medicului veterinar.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc uscat, întunecat, inaccesibil copiilor, la o temperatură de la 15°C până la 25°C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de medicamente trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Când lucrați cu medicamentul, este necesar să respectați regulile generale de igienă personală și măsurile de siguranță prevăzute atunci când lucrați cu medicamente de uz veterinar.

Nu manipulați medicamentul dacă știți că sunteți alergici la cefalosporine.

Când lucrați cu medicamentul, este interzis să fumați, să beți, să mâncați.

După manipularea medicamentului, spălați-vă bine mâinile cu apă și săpun.





Utilizare în perioada de gestație și lactație:

Nu este recomandată utilizarea medicamentului în perioada de gestație, dar poate fi administrat în timpul perioadei de lactație.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu se cunosc.

Supradozare:

Supradozarea nu apare deoarece medicamentul este prezentat sub forma de seringă, pentru doză unică.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

3 ani.

Perioada de valabilitate a medicamentului după prima deschidere: este utilizat imediat.

A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează în baza prescripției veterinare.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Seringă tub de 19 g, ambalate în pungi de plastic în complet cu catetere și mănuși de unică folosință, în cutii de carton.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

07.2022

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

