

REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Metristar

Suspensie pentru administrarea intrauterine

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

1 tub de seringă (19 g) conține:

Substanța activă:

Cefapirin benzatin - 500 mg.

Excipienți:

Polioxil - 20, polioxil - 12, alcool benzilic, ulei de ricin, kolisolv MST70.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Suspensie pentru uz intrauterin.

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1 Specii-țintă:

Bovine (vacii).

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor-țintă:

În tratamentul vacilor cu endometrită subacută și cronică (nu mai devreme de 14 zile după fătare) cauzată de microorganisme sensibile la cefapirină.

4.3 Contraindicații:

A nu se utiliza mai devreme de 14 zile de la fătare.

A nu se administra animalelor cu hipersensibilitate la cefalosporine.

A nu se administra cu antibiotice din alte grupuri.

A nu se utiliza la animalele gestante.

4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Nu sunt.

4.5 Precauții speciale pentru utilizare:

4.5.1 Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Nu sunt.



4.5.2 Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Când manipulați medicamentul, este necesar să respectați regulile generale de igienă personală și măsurile de siguranță prevăzute atunci când lucrați cu medicamente de uz veterinar.

Nu manipulați medicamentul dacă știți că sunteți alergici la cefalosporine.

Când lucrați cu medicamentul, este interzis să fumați, să beți, să mâncați.

După manipularea medicamentului, spălați-vă bine mâinile cu apă și săpun.

4.6 Reacții adverse (frecvență și gravitate):

Nu sunt.

4.7 Utilizare în perioada de gestație și lactație:

Nu este recomandată utilizarea medicamentului în perioada de gestație, dar poate fi administrat în timpul perioadei de lactație.

4.8 Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu se cunosc.

4.9 Doză și calea de administrare:

Intrauterin, folosind un cateter de unică folosință, se administrează conținutul unui tub de seringă, care, de regulă, este suficient pentru vindecarea completă a animalului.

Pentru aceasta, tubul seringii este conectat la cateter, se fixează colul uterin cu mâna, fixat prin rect, cateterul racordat la seringă este introdus cu atenție prin cervix în uter, se administrează conținutul prin apăsarea pistonului seringi. Dacă este necesar, repetați procedura după 48 de ore.

4.10 Supradozare:

Supradozarea nu apare deoarece medicamentul este prezentat sub forma de seringă, pentru doză unică.

4.11 Perioada de așteptare:

Carne - 24 ore de la ultima administrare

Lapte – zero ore.

În cazul sacrificării forțate a animalelor, carnea poate fi folosită în hrana animalelor neproductive sau se elimină, în conformitate cu concluzia medicului veterinar.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăți farmacodinamice:

5.1.1 Grupa farmacoterapeutică: Antiinfecțioase și antiseptice pentru utilizarea intrauterină.

Codul ATC: QG51AA05



Cefapirin benzatin este un antibiotic cu spectru larg de acțiune, este activ împotriva bacteriilor Gram pozitive și Gram negative (E. coli, Actinobacillus, Salmonella spp, Klebsiella spp, Corinebacterium spp, Haemophilus spp, Pasteurella spp, Staphilococcus spp, Streptococcus pyogenes, Proteus spp, Enterobacter spp. și altele).

Cefapirin este rezistent la acțiunea penicilinazei și este activ în mediul anaerob.

5.2 Proprietăți farmacocinetice:

După tratamentul intrauterin absorbția sistemică este redusă, fapt demonstrat de nivelele plasmatic reduse de cefapirin observate la scurt timp după tratament. La 12 ore de la tratament nivelul plasmatic de cefapirin era sub nivelul de detecție.

După administrarea intrauterină de Metristar, s-au observat concentrații mari de cefapirin la nivelul endometrului.

După un singură administrare, concentrația de cefapirin din țesutul endometrial se menține timp de cel puțin 24 ore.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților:

Polioxil - 20, polioxil -12, alcool benzilic, ulei de ricin, kolisolv MST70.

6.2 Incompatibilități:

Nu sunt.

6.3 Perioada de valabilitate:

3 ani.

Perioada de valabilitate a medicamentului după prima deschidere: este utilizat imediat.

6.4 Condiții speciale pentru depozitare:

A se păstra la loc uscat, întunecat, inaccesibil copiilor, la o temperatură de la 15°C până la 25°C.

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar:

Seringă tub de 19 g, ambalate în pungi de plastic în complet cu catetere și mănuși de unică folosință, în cutii de carton.

6.6 Măsuri speciale pentru eliminarea medicamentelor de uz veterinar neutralizate, sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse:

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de medicamente trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.



7. DEȚINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

Întreprinderea Particulară „O.L. KAR-AgroZooVet-Service”

str. Eroilor Maidanului, 272 B, or. Șargorod, reg. Vinița, Ucraina, 23500

tel.: +38 (043) 442-12-54, fax: +38 (043) 442-17-87

e-mail: vet@olkar.com.ua, www.agroolkar.com.ua

8. NUMĂRUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

220046

9. DATA PRIMEI ELIBERĂRI A CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

13.07.2022

10. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

07/2022

