

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

FLOREEF

Soluție orală

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect.
- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Deținătorul certificatului de înregistrare:

REEFCO, AL Reef Company for Manufacturing Veterinary Drugs & Agrochemicals,
tel. 0096227395106, info@reef-co.com

Producător pentru eliberarea seriei:

REEFCO, AL Reef Company for Manufacturing Veterinary Drugs & Agrochemicals,
tel. 0096227395106, info@reef-co.com

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

FLOREEF

Soluție orală.


Fiecare ml conține:

Substanță activă:

Florfenicol 100 mg

Lista excipienților: N-Methyl pyrrolidone (NMP-1) – 200 mg, glacial acetic acid – 50 mg, Tween 20 - (Polyethylene Sorbitan Fatty acid esters) – 150 mg, propylene glycol (diluente) – 1ml.

Soluție limpede incoloră spre galbenă.



3. INDICAȚII TERAPEUTICE

FLOREEF este indicat pentru tratamentul infecțiilor căilor respiratorii și enteritelor, care sunt cauzate de: E. coli, Salmonella și bacterii sensibile la florfenicol care duce la: colibaciloză, enterită, enterotoxemie și infecții respiratorii cronice complicate precum: CRD și coriza infecțioasă.

4. CONTRAINDICAȚII

A nu se utiliza în caz de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.

5. REACȚII ADVERSE

Păsări:

Pe durata tratamentului poate apărea o reducere a consumului de furaj sau o ușoară diaree. Animalele tratate își revin imediat și complet după finisarea tratamentului.

6. SPECII ȚINTĂ

Păsări.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Administrare pe cale orală.

Păsări:

200 ml / 200 litri de apă timp de 3-5 zile.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Carne și organe: 5 zile.

Nu este destinat animalelor de la care se obțin ouă pentru consumul uman.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A nu se păstra la temperaturi mai ridicate de 30 °C. A se păstra la loc uscat și ferit de lumină.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe ambalajul secundar și flacon, după EXP.

După ce flaconul este deschis pentru prima oară menționați pe spațiul special de pe etichetă data în care medicamentul rămas neutilizat va fi eliminat.

Eliminați medicamentul rămas în flacon după această dată.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de medicamente trebuie eliminate în conformitate cu cerințele naționale.



11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Precauții speciale pentru utilizare la animale

Utilizarea medicamentului se va efectua pe baza unor teste de susceptibilitate a bacteriilor izolate de la animale. Dacă acest lucru nu este posibil terapia se va baza pe informațiile epidemiologice locale (regionale, la nivel de fermă) referitoare la susceptibilitatea bacteriilor izolate.

Utilizarea medicamentului în afara instrucțiunilor din RCM poate duce la creșterea prevalenței rezistenței la substanța activă și poate determina scăderea eficacității tratamentelor ca urmare a rezistenței încrucișate. Trebuie luate în considerare politicile antimicrobiene naționale și regionale, atunci când se utilizează medicamentul.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanța activă sau la oricare dintre componenți trebuie să evite contactul cu medicamentul de uz veterinar.

După manipularea medicamentului spălați mâinile.

Utilizarea în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat

Nu este destinat animalelor de la care se obțin ouă pentru consumul uman.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

Floreef nu se va administra concomitent cu medicamente pe bază de tiamfenicol sau cloramfenicol.

Supradozare

Nu se vor depăși dozele și perioada de tratament recomandate.

Incompatibilități

În absența studiilor de compatibilitate, acest medicamentul de uz veterinar nu trebuie amestecat cu alte medicamente de uz veterinar.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a medicamentului de uz veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 3 ani.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 90 zile.

După dizolvarea în apă a se folosi timp de 24 ore.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează în baza prescripției veterinare.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacoane de plastic: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 litru, 5 litri.

14. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

09.2022

