

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Ciprovet picături oftalmice

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, agresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, agresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.
- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

OOO NVȚ „Agrovezașcita S-P”, 141305, Federația Rusă, reg. Moscova,
or. Serghiev Posad, str. Țentralinaia 1

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Ciprovet picături oftalmice

Denumirea internațională nepatentată: ciprofloxacină.

Soluție transparentă incoloră sau de culoare galbenă deschisă.

În 1 ml se conține:

Substanța activă:

Ciprofloxacină hidroclohid – 4,5 mg

Excipienți:

Clorură de benzalconiu – 0,05 mg, trilon B - 0,08 mg, apă pentru injecții până la 100 ml

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Ciprovet picături oftalmice se indică cânilor și pisicilor în următoarele cazuri:

- în tratamentul afecțiunilor grave și cronice a ochilor: în conjunctivite acute și cronice, cheratoconjunctivite, cheratite, ulcere a corneei, iridociclite septice, blefarite;
- cu scopul scăderii riscului apariției infecțiilor oculare în urma traumelor și pătrunderea corpurilor străine, la fel și în chirurgia oftalmologică în perioadele preoperatorie și postoperatorie.

4. CONTRAINDICAȚII

Se interzice administrarea medicamentului în caz de sensibilitate individuală sporită a animalului la fluorochinolone.





5. REACȚII ADVERSE

În urma administrării medicamentului de uz veterinar conform instrucțiunii date, reacții adverse și complicații nu au fost înregistrate. În rare cazuri medicamentul poate provoca o ușoară senzație de durere, hiperemia conjunctivei, prurit, lăcrimare, care trec de la sine timp de 5 minute.

În caz de apariție a reacției alergice (continuă sau sporește hiperemia conjunctivală) administrarea medicamentului se stopează și se indică animalului medicamentele antihistaminice și terapie simptomatică.

6. SPECII ȚINTĂ

Câini, pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Ciprovet picături oftalmice se picură în cavitatea conjunctivală a ochiului afectat: pisicilor - câte 1 picătură, câinilor - câte 1-2 picături de 4 ori pe zi, timp de 7-14 zile până la dispariția simptomelor.

În caz de eliminări purulente sau sero-purulente, în prealabil se efectuează igiena ochiului – se picură 3-4 picături de medicament și se șterge cu un tampon steril de tifon.

După igienizare se picură 1-2 picături de medicament și se efectuează tratamentul.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra Ciprovet picături oftalmice în ambalaj închis a producătorului, la loc ferit de raze solare directe, aparte de produse alimentare și furaje, la T⁰ de la +5⁰C până la +25⁰C.

A se păstra în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Medicamentul de uz veterinar nefolosit se elimină conform reglementării locale.

Ambalajele deșerte ale medicamentului se interzice de a fi folosite în scopuri casnice; ele se elimină cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

A nu se utiliza la pisicuțe și căței cu vârsta sub 7 zile.

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Ciprovet picături oftalmice se administrează cu precauție la animalele cu ateroscleroză a vaselor cerebrale și dereglarea circulației cerebrale.

Nu se administrează animalelor productive.

Particularități deosebite la prima administrare a medicamentului sau la anularea lui nu au fost înregistrate.

Se recomandă respectarea intervalelor și dozelor pentru a nu diminua eficiența terapeutică.



La omiterea administrării a unei sau a mai multor doze, tratamentul se reia conform schemei și dozelor de administrare.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează:

În timpul lucrului cu picăturile oftalmice Ciprovet se recomandă respectarea regulilor de igienă personală și a tehnicii securității, prevăzute în lucru cu medicamente de uz veterinar.

Se interzice fumatul și consumul de băuturi și alimente.

La sfârșirea lucrului, mâinile se spală cu apă și săpun.

În caz de contact accidental cu pielea sau tunicile mucoase oculare, ele se spală din abundență cu apă.

Persoanelor cu hiposensibilitate la componentele medicamentului se recomandă evitarea contactului direct cu medicamentul de uz veterinar.

În caz de ingerare sau apariție a reacțiilor alergice e necesar de adresat la o instituție medicală (cu sine de avut eticheta sau prospectul de utilizare).

Utilizarea în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Posibilitatea administrării picăturilor oftalmice Ciprovet la câini și pisici în perioada de gestație și lactație, și de asemenea descendenților, se va determina de către medicul veterinar responsabil în baza evaluării raportului risc/ beneficiu în urma administrării a medicamentului.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Ciprovet picături oftalmice incompatibil cu soluțiile medicamentoase, cu valoarea pH-ului de 3-4, care sunt instabile din punct de vedere fizic sau chimic.

Atunci când se utilizează alte medicamente oftalmice, intervalul dintre administrarea acestora trebuie să fie de cel puțin 5 minute.

Supradozare

Simptome de supradozare la animale nu au fost înregistrate.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Valabilitatea medicamentului de uz veterinar în ambalajul închis al producătorului cu respectarea condițiilor de păstrare: 3 ani din data producerii.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 30 zile.

A nu se folosi după expirarea termenului indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează cu prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Ciprovet picături oftalmice ambalat a câte 5; 10 și 20 ml în flacoane din sticlă închise cu capace din polimer sau flacoane din sticlă, cu dopuri din cauciuc și capace din aluminiu, ambalaj secundar fiind cutia de carton și însoțite de instrucțiune la administrare.

15. DATA ULTIMII REVIZUIRI A TEXTULUI

12.2022

16. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL "Zoofarmagro", m. Chișinău, str. Camenița 4a;

Tel/fax +373 022 855-071; Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR!