

PROSPECT

Cevac Megamune ND-IB-EDS-SHS K – vaccin inactivat.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, DACĂ SUNT DIFERITEDeținătorul certificatului de înregistrare și producătorul responsabil pentru eliberarea seriei:

Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd.

1107 Budapest, Szállás u. 5, UNGARIA

Fax: /36-1/ 260-3889

Telephone: /36-1/ 262-9505

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Cevac Megamune ND-IB-EDS-SHS K

Emulsie injectabilă.

3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI)

Substanța activă: Cevac Megamune ND-IB-EDS-SHS K conține o combinație inactivată de tulpina LaSota a virusului bolii Newcastle, tulpinile de serotip Massachusetts și QX-like ale virusului bronșitei infecțioase, tulpina B8/78 a virusului sindromului căderii ouatului și o tulpină de subtip B. de metapneumovirus aviar, omogenizat cu adjuvant uleios și tiomersal ca conservant.


1 doză de vaccin conține:

Virus inactivat al bolii Newcastle tulpina NDV-SZ LaSota	min. 4 log ₂ HI* titru sau min. 50 PD50**
Virus inactivat al bronșitei infecțioase aviare, tulpina M-41	min. 4.9 log ₂ HI titru
Virus inactivat al bronșitei infecțioase aviare, tulpina QX Fr.	min. 1 RPU***
Virus inactivat al sindromului căderii ouatului, tulpina B8/78	min. 7 log ₂ HI titru
Metapneumovirus aviar inactivat, tulpina TRT50	min. 20 unități antigen ELISA

* HI – Inhibarea hemaglutinării

** PD – Doză de protecție

*** RPU – Unitate de potență relativă

Excipienți: Parafină ușoară lichidă, Tiomersal, Soluție PBS.

4. INDICAȚIE TERAPEUTICE

Cevac Megamune ND-IB-EDS-SHS K este recomandat pentru vaccinarea efectivelor de puicuțe ouătoare și reproducători,

- pentru a reduce mortalitatea, semnele clinice, leziunile și eliminarea virusului cauzat de virusul bolii Newcastle;
- pentru a reduce căderea ouatului, semnele respiratorii și eliminarea virusului cauzate de serotipurile Massachusetts și QX-like ale virusului bronșitei infecțioase;
- pentru a reduce căderea ouălor cauzată de virusul sindromului căderii ouatului;
- pentru a reduce semnele respiratorii (de exemplu, semnele legate de sindromul capului umflat) și eliminarea virusului cauzat de metapneumovirusul aviar.

Păsările trebuie imunizate în prealabil cu vaccinuri vii împotriva virusurilor ND, IB și AMP.

5. CONTRAINDICAȚII

Nu sunt.

6. REACȚII ADVERSE

Vaccinarea nu provoacă reacții sistemice. La locul injectării se poate dezvolta o umflătură de mărimea bobului de mazăre. În majoritatea cazurilor, aceasta dispare în 2-3 săptămâni.

Dacă observați orice reacție adversă, chiar și cele care nu sunt deja incluse în acest prospect sau credeți că medicamentul nu a avut efect vă rugăm să informați medicul veterinar.

7. SPECII ȚINTĂ

Pui de găină.

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Cevac Megamune ND-IB-EDS-SHS K trebuie administrat începând cu vârsta de 14 săptămâni, dar nu mai târziu de 3 săptămâni înainte de debutul preconizat al perioadei de ouat.

Doza de vaccin este de 0,5 ml, injectată pe cale intramusculară (în mușchii pieptului) sau subcutanat (în ceafă).

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Utilizați echipament de injecție steril.

Păstrați vaccinul la temperatura camerei (15 °C până la 25 °C) timp de 3 până la 4 ore înainte de utilizare.


Agitați bine flaconul înainte de utilizare.

Verificați acuratețea seringii pentru a vă asigura că este administrată doza corectă.

Odată deschis un flacon, conținutul acesteia trebuie epuizat în termen de o zi lucrătoare; în caz contrar, va trebui aruncat.

10. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Zero zile.



11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra și transporta în condiții de refrigerare (2 °C - 8 °C).

A nu se congela.

A se proteja de lumină.

A nu se utiliza acest vaccin după data expirării marcată pe cutie și flacon după EXP. Data expirării se referă la ultima zi din acea lună.

12. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă

Vaccinați doar animalele sănătoase.

Precauții speciale pentru utilizare la animale

O protecție satisfăcătoare poate fi obținută numai la păsările bine dezvoltate și sănătoase.

Utilizați echipament de injecție steril.

Păstrați vaccinul la temperatura camerei (15 °C până la 25 °C) timp de 3 până la 4 ore înainte de utilizare.

Agitați bine flaconul înainte de utilizare.

Verificați acuratețea seringii pentru a vă asigura că este administrată doza corectă.

Odată deschis un flacon, conținutul acesteia trebuie epuizat în termen de o zi lucrătoare; în caz contrar, ar trebui aruncat.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează vaccinul la animale

În cazul unei injecții accidentale cu acest vaccin, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați prospectul medicamentului de uz veterinar imunologic.

Păsări ouătoare care produc ouă pentru consum uman

Nu se utilizează la păsări în perioada de ouat și în interval de 4 săptămâni înainte de începerea perioadei de ouat.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu se cunosc. A nu se amesteca cu alte vaccinuri.

Supradozare:

Nu este cazul.

Incompatibilități:


Nu se cunosc. A nu se amesteca cu alte vaccinuri.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice medicament de uz veterinar imunologic neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

07.2023



15. ALTE INFORMAȚII

Flacoane din plastic de 100 și 500 ml, închise cu dopuri din cauciuc și capse de plastic-aluminiu.
Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

Se eliberează numai pe bază de prescripție veterinară.

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar imunologic, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.

