

**PROSPECT
CRIMECTIN PLUS,****10/100 mg/ml, soluție injectabilă pentru bovine****1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, DACĂ SUNT DIFERITE****Deținătorul certificatului de înregistrare**

S.C. CRIDA PHARM S.R.L. Str. Intrarea Vagonetului, Nr. 2, Bloc 101, Ap. 47, Parter, Sector 6, București.

Tel/Fax: +4021 430 43 99, e-mail: office@cridapharm.ro

Producătorul responsabil pentru eliberarea seriilor de produs

S.C. CRIDA PHARM S.R.L. Str. Stadionului, Nr. 1, Oltenița, Jud. Călărași.

Tel: +4024 251.50.05, Tel/fax: +4024 251.59.25, e-mail: office@cridapharm.ro

**2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR
CRIMECTIN PLUS, 10/100 mg/ml, soluție injectabilă pentru bovine.**

Ivermectina

Clorsulon

3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI) Fiecare ml de produs conține:

Fiecare ml de medicament conține:

Substanța activă:

Ivermectina 10 mg

Clorsulon 100 mg

Excipienți:

Propilen glicol

Glicerol formal

4. INDICAȚII TERAPEUTICE (pe specii țintă)

Crimectin PLUS este recomandat în prevenirea (în efectivele în care diagnosticul a fost confirmat) și în tratamentul următoarelor infestații parazitare:

Nematodoze gastrointestinale produse de *Ostertagia ostertagi* (adulti, L4 și L3, inclusiv stadiile larvare), *Ostertagia lyrata* (adulti și L4), *Haemonchus placei* (adulti L4 și L3 inclusiv stadiile larvare inhibitate), *Mecistocirrus digitatus* (adulti), *Trichostrongylus axei* (adulti și L4), *Trichostrongylus columbriformis* (adulti și L4), *Cooperia* spp. (adulti, L4 și L3) *Cooperia oncophora* (adulti și L4), *Cooperia punctata* (adulti și L4), *Cooperia pectinata* (adulti și L4), *Nematodirus helvetianus* (adulti), *Nematodirus spathiger* (adulti); *Strongyloides papillosus* (adulti), *Bunostomum phlebotomum* (adulti, L3 și L4), *Toxocara vitulorum* (adulti, L4 și L3); *Oesophagostomum radiatum* (adulti, L3 și L4); *Trichuris* spp. (adulti).Nematodoze oculare produse de *Thelazia* spp. (adulti).Nematodoze pulmonare produse de *Dictyocaulus viviparus* (adulti, L4, inclusiv stadiile larvare inhibitate).Hipodermoza produsa de *Hypoderma bovis*, *Hypoderma lineatum*, *Dermatobia hominis* (toate stadiile larvare).Miaze: *Chrysomya benzzenia*, *Cochilomyia hominivorax*.Infestații cu păduchi hematofagi (înțepători): *Linognathus vituli*; *Haematopinus eurystermus*; *Solenopotes capillatus*.

Agencia Națională pentru Siguranța Alimentelor
MD-2009, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 63
INREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

Scabia produsa de: *Psoroptes ovis*, *Sarcoptes scabiei*.

Infestații cu căpușe: *Ornithodoros savignyi*, *Boophilus microplus*, *Boophilus decoloratus* (paraziți rezistenți la organofosforice, piretroide sintetice și amide).

Trematodoze produse de *Fasciola hepatica*; *Fasciola gigantica* (formele adulte și forme imature).

Crimectin Plus ajută în controlul infestațiilor cu:

Păduchi (malofagi): *Damalinia bovis*

Acarienii râiei: *Chorioptes bovis*

Crimectin Plus administrat în doza recomandată de 1ml/50 kg greutate corporală controlează eficient reinfestările cu *Haemonchus placei*, *Trichostrongylus axei*, *Cooperia punctata*, *Cooperia oncophora* și *Cooperia surnabada* timp de 14 zile după primul tratament; *Ostertagia ostertagi* și *Oesophagostomum radiatum* timp de 21 de zile după primul tratament și *Dyctiocaulus viviparus* timp de 28 de zile după primul tratament.

Crimectin Plus previne invazia cu larve de *Chrysomya benzzenia*. Tratamentul este eficient împotriva larvelor în vârstă de maxim două zile; larvele mature rezistă trei sau mai multe zile după tratament. Crimectin Plus poate fi utilizat preventiv în proceduri planificate cum sunt castrarea, crotalierea împiedicând invazia cu *Chrysomya benzzenia* timp de 14 zile după tratament.

Pentru a preveni dezvoltarea larvelor de *Chrysomya benzzenia* la nivelul ombilicului la vițeii nou fătați Crimectin Plus se administrează în cel mult 24 de ore de la fătare.

După procedura de castrare a vițeilor se administrează imediat Crimectin Plus. Toate animalele injectate cu Crimectin Plus, la naștere sau castrare vor fi examinate zilnic până la vindecarea completă a rănilor. Dacă este necesar se aplică un insecticid pentru uz extern.

5. CONTRAINDICAȚII

Nu se administrează pe cale intramusculară sau intravenoasă.

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanțele active sau la oricare dintre excipienți.

6. REACȚII ADVERSE

În urma administrării subcutanate a fost observat la unele animale un disconfort trecător. Ocazional, poate să apară o ușoară reacție inflamatorie la locul injectării, reacție ce se remite spontan. Dacă observați orice reacție adversă, chiar și cele care nu sunt deja incluse în acest prospect sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm informați medicul veterinar.

7. SPECII ȚINTĂ

Bovine.

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Doza recomandată pentru bovine este de 1 ml/50 kg greutate corporală (echivalent cu 200 mcg ivermectină/kg greutate corporală și 2 mg clorsulon/kg greutate corporală).

Administrarea se va face numai prin injecție subcutanată, sub pielea din fața sau din spatele omoplaților.

9. RECOMANDARI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Când temperatura medicamentului este mai mică de 5°C, administrarea poate fi îngreunată din cauza vâscozității medicamentului. Injectarea poate fi facilitată prin încălzirea medicamentului și a echipamentului de injectare la cca 15°C. Se recomandă utilizarea unui ac de calibru 16, cu lungime de 15 sau 20 mm. A se utiliza echipament steril.

În vederea asigurării administrării dozei corecte, greutatea corporală trebuie determinată cât mai corect posibil; se va verifica precizia echipamentului de dozare.

Program de tratament în regiunile cu *Hypoderma* spp.

Ivermectina este foarte eficientă împotriva tuturor stadiilor larvelor *Hypoderma* spp. Pentru obținerea celor mai bune rezultate, vacile trebuie tratate cât mai curând posibil după terminarea sezonului muștelor. Fără a avea legătură cu ivermectină, distrugerea larvei *Hypoderma* în timpul în care aceasta se află în zone vitale ale organismului poate cauza reacții gazdă-parazit, nedorite. Astfel, dacă larva *Hypoderma lineatum* este omorâtă atunci când se află în țesutul esofagian poate crea dilatare gastrică-volvulus sau paralizie în cazul în care în canalul vertebral se află *Hypoderma bovis*. De aceea, tratamentele trebuie efectuate înainte sau după aceste stadii de migrare a larvelor. Bovinele tratate cu ivermectină după terminarea sezonului muștelor (în septembrie) pot fi tratate din nou cu ivermectină în timpul iernii pentru parazitozele interne, râie sau păduchi, distrugând astfel și posibilele larve responsabile de hipodermoză.

10. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Carne și organe: 66 de zile.

Nu este autorizată utilizarea la animale care produc lapte pentru consum uman.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se păstra la temperatură mai mare de 25°C.

A nu se refrigera sau congela.

A se păstra în ambalajul original.

A se păstra în loc uscat.

A se proteja de lumina directă.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.

12. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă

Se recomandă evitarea următoarelor practici, deoarece acestea cresc riscul de dezvoltare al rezistenței paraziților și pot face terapia inefficientă:

- utilizarea prea frecventă și repetată a antihelminticilor din aceeași clasă, pe o perioadă prea mare;
- subdozarea din cauza subestimării greutatei corporale, administrarea incorectă a produsului, decalibrarea echipamentului de dozare (dacă se folosește).

Toate cazurile suspecte de rezistență la antihelmintice trebuie să fie investigate în continuare folosind teste potrivite (de ex. testul de reducere a numărului de ouă din fecale). Acolo unde testele sugerează în mod clar o rezistență la un anumit antihelmintic, se va utiliza un altul aparținând unei alte clase farmacologice a cărui mod de acțiune este diferit. Rezistența la lactonele macrociclice (care includ avermectina, ivermectina) a fost raportată la *Cooperia* spp. la bovine, în cadrul UE și alte specii parazite din afara UE. Motiv pentru care, utilizarea acestui medicament trebuie să se bazeze pe informațiile locale de natură epidemiologică referitoare la susceptibilitatea nematodelor și recomandări despre modalitatea de a limita evoluția rezistenței la antihelmintice.

Precauții speciale pentru utilizare la animale

Dozele mai mari de 10 ml se vor administra în două injecții în două locuri diferite pentru a reduce disconfortul trecător sau reacțiile adverse la locul injecției. Pentru alte medicamente cu administrare parentală se vor folosi alte locuri de injectare.

Se va administra numai la speciile indicate în prospect așa cum se menționează la secțiunea dozare și administrare.

Medicamentul trebuie administrat numai prin injecție subcutanată, folosind orice element de echipament destinat speciei țintă fie el standard automat sau calibrat pentru o singură doză, sub pielea din fața sau din spatele omoplaților, folosind un ac steril.

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
MD-2009, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

Cutie din carton colectivă care conține:
192 flacoane din polipropilenă x 50 ml fiecare
120 flacoane din polipropilenă x 100 ml fiecare
60 flacoane din polipropilenă x 250 ml fiecare
40 flacoane din polipropilenă x 500 ml fiecare
60 flacoane din sticlă x 100 ml fiecare
30 flacoane din sticlă x 250 ml fiecare

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

Se eliberează numai pe bază de prescripție veterinară.

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.

"ZOOFARMAGRO" S.R.L. "ZOOFARMAGRO" S.R.L. "ZOOFARMAGRO" S.R.L.
REPUBLICA MOLDOVA
"ZOOFARMAGRO" S.R.L.
MD-2001, mun. Chișinău, str. Căminuța, 4a,
IDNO 1002600041804 / TVA 0603423
IBAN MD26FT222490700000216498
B.C. „FinComBank” S.A.