

PROSPECT

TIMPANON
emulsie orală

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, DACĂ SUNT DIFERITE

Întreprinderea Particulară „OLKAR-AgroZooVet-Service” str. Eroilor Maidanului (Lenin), 272B, or. Șargorod, reg. Vinița, 23500, Ucraina tel. / fax: (0432) 55-14-28, (0432) 55-14-27

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

TIMPANON emulsie pentru uz oral

3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI)

100 ml de medicament conține substanțe active (mg):

Substanța activă:

Tinctură de strigoaie – 3,5;

Simeticon (antispumant siliconic) – 3,0;

Acid lactic – 3,0;

Tinctură de pelin – 2,5;

Tinctură de pojarniță – 3,5.

Excipienți:

Alcool polivinilic – 2,0; alcool benzilic -1,5; apă distilată – până la 100 ml.

Emulsie orală, omogenă de culoare maro deschis cu un miros ușor specific.

4. INDICAȚII TERAPEUTICE

Pentru tratamentul bovinelor, caprinelor și ovinelor în cazul indigestiei acute timpanismului ruminal.

5. CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează la animalele cu hipersensibilitate la componentele medicamentului.

A nu se utiliza la animale care nu sunt vizate.

A nu se utiliza la animale slăbite și bolnave, inclusiv celor cu boli infecțioase.

6. REACȚII ADVERSE

Reacții adverse nu au fost înregistrate.

7. SPECII ȚINTĂ

Bovine, ovine, caprine.

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Medicamentul se administrează intern în doze:

Bovine - 4-5 ml la 10 kg greutate corporală;

Ovine, caprine - 5-10 ml la 10 kg greutate corporală.

Înainte de utilizare, medicamentul este diluat cu apă în raport de 1:10 sau 1:15 (1 parte TIMPANON la 10-15 părți de apă).

Dacă simptomele bolii nu dispar în 15-20 de minute de la administrare, medicamentul de uz veterinar se administrează animalului în mod repetat în dozele indicate, dar la o diluție de 1:5.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Înainte de utilizare flaconul este bine agitat!

10. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Carne - zero zile.

Lapte - zero zile.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra în loc uscat, a se proteja de lumină solară directă, inaccesibil copiilor, la temperaturi de la +1°C până la +35°C, aparte de produsele alimentare.

Perioada de valabilitate a medicamentului de uz veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 24 luni.

Perioada de valabilitate a medicamentului după prima deschidere este de 7 zile (la temperaturi de la +1°C până la +35°C).

12. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Nu sunt.

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Pentru bovine, caprine, ovine, medicamentul se administrează pe cale orală cu o sticlă din cauciuc sau printr-o sondă buco-esofagiană direct în cavitatea rumenului.

Este posibil să se administreze medicamentul în cavitatea rumenului prin străpungerea peretelui abdominal cu un troacar sau cu un ac de injectare.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Respectați regulile de igienă personală și de fixare sigură a animalelor.

Utilizare în perioada de gestație, lactație:

Poate fi utilizat în perioada de gestație și lactație.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu se utilizează simultan cu alte medicamente de uz veterinar ruminatorii.

Supradozare:

Nu s-au înregistrat cazuri.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

07.2023

15. ALTE INFORMAȚII

Natura și compoziția ambalajului primar:

Flacoane din sticlă de 50; 100; 250; 500 ml, 1000 ml; Sticle de 5000 ml.

Flacoane din polimer de 100; 250; 500 ml, 1000 ml; Canistre de 5000 ml.

Se eliberează fără o prescripție veterinară.

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.