



## 6. REACȚII ADVERSE

Administrarea pe cale intramusculară poate cauza la bovine reacții tranzitorii la locul injectării, cum ar fi durerea și ușoare leziuni musculare de natură inflamatorie (cauzând fibroză). Procesul de cicatrizare începe rapid (variind de la fibroză la sinteza matricei extracelulare și a colagenului) și poate persista cel puțin 15 zile de la data injectării.

Administrarea pe cale subcutanată poate induce un edem ușor spre moderat la locul de injecție. La unele animale, poate apărea o ușoară durere la palparea locului injectat.

La porcine, administrarea pe cale intramusculară poate induce un edem ușor, tranzitoriu și leziuni inflamatorii la locul de injecție care pot persista până la 12 zile de la data injectării.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm să informați medicul veterinar.

## 7. SPECII ȚINTĂ

Bovine și porcine (scroafe)

## 8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

### Bovine

#### **Administrare intramusculară**

##### *- Afecțiuni respiratorii*

Doza recomandată este de 8 mg / kg greutate vie, ceea ce corespunde cu 2 ml / 25 kg greutate vie, într-o singură injecție intramusculară.

Dacă volumul administrat este mai mare de 20 ml, acesta trebuie administrat în două sau mai multe locuri.

#### **Administrare subcutanată**

##### *- Mastite acute*

Doza recomandată este de 2 mg / kg greutate vie, ceea ce corespunde cu 1 ml / 50 kg greutate vie, într-o singură injecție zilnică, timp de 3 zile

Prima injecție poate fi administrată și pe cale intravenoasă.

### Scroafe

#### **Administrare intramusculară**

Doza recomandată este de 2 mg / kg greutate vie, ceea ce corespunde cu 1 ml / 50 kg greutate vie, într-o singură injecție intramusculară, zilnic timp de 3 zile.

## 9. RECOMANDĂRI PENTRU ADMINISTRAREA CORECTĂ

Pentru a asigura o dozare corectă, se va determina greutatea corporală cât mai exact, pentru a evita subdozarea.

## 10. PERIOADA DE AȘTEPTARE

### **Bovine**

Administrare intramusculară: Carne și organe: 3 zile, lapte: 72 de ore.

Administrare subcutanată: Carne și organe: 6 zile, lapte: 36 de ore.

### **Scroafe**

Administrare intramusculară: Carne și organe: 4 zile.



## 11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra flaconul în ambalajul secundar pentru a fi protejat de lumină.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a flaconului: 28 zile.

## 12. ATENȚIONĂRI SPECIALE

### Precauții speciale pentru utilizare la animale

Medicamentul de uz veterinar trebuie utilizat pe baza testului de susceptibilitate și ținând cont de politicile antimicrobiene locale și oficiale.

Fluorochinolonele ar trebui utilizate pentru tratamentul bolilor clinice care au reacționat slab sau care se așteaptă să reacționeze slab față de alte clase de antimicrobiene.

Utilizarea medicamentului de uz veterinar cu abatere de la instrucțiunile menționate în rezumat poate favoriza răspândirea bacteriilor rezistente la fluorochinolone și poate scădea eficacitatea tratamentului cu alte chinolone, datorită rezistenței încrucișate a acestora.

Întrucât flaconul nu poate fi deschis mai mult de 45 de ori, utilizatorul trebuie să aleagă cea mai adecvată dimensiune a flaconului, conform cu specia țintă ce urmează a fi tratată.

Injecțiile trebuie făcute în zona gâtului, atât la bovine cât și la porcine.

### Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la (fluoro) chinolone trebuie să evite contactul cu medicamentul de uz veterinar.

În cazul contactului accidental cu ochii sau pielea, clătiți cu multă apă.

Luați toate măsurile pentru a evita autoinjectarea accidentală, deoarece poate induce o ușoară iritare.

În caz de autoinjectare accidentală, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați prospectul medicamentului de uz veterinar.

Spălați mâinile după utilizare.

### Utilizarea în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat

Studiile efectuate pe animalele de laborator (șobolani, iepuri) nu au evidențiat prezența efectului teratogen, embriotoxic sau maternotoxic asociat cu utilizarea marbofloxacinului.

Siguranța medicamentului de uz veterinar la doza de 2 mg/kg a fost demonstrată la vacile gestante sau la purceii și vițeeii sugari când medicamentul de uz veterinar a fost administrat la scroafe și vaci.

Siguranța medicamentului de uz veterinar la doza de 8 mg/kg nu a fost demonstrată la vacile gestante sau la vițeeii sugari când medicamentul de uz veterinar a fost administrat la vaci. De aceea utilizarea se va face conform cu evaluarea raportului risc/beneficiu de către medicul veterinar responsabil.

### Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidot)

La bovine nu s-au observat semne de supradozare chiar după administrarea unei doze de 3 ori mai mari decât doza recomandată.

Supradozarea poate cauza modificări cum ar fi tulburări neurologice acute, care trebuie tratate simptomatice.

### Incompatibilități

În absența studiilor de compatibilitate, acest medicament de uz veterinar nu trebuie amestecat cu alte medicamente de uz veterinar.



**13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR**

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de medicamente, trebuie eliminate în conformitate cu legislația în vigoare.

**14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL**

09.2023

**15. ALTE INFORMAȚII**

Mărimea ambalajului

- Cutie de carton ce conține 1 flacon de 50 ml
- Cutie de carton ce conține 1 flacon de 100 ml
- Cutie de carton ce conține 1 flacon de 250 ml
- Cutie de carton ce conține 1 flacon de 500 ml

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.

