

## PROSPECT

### UNISAN

#### **1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, DACĂ SUNT DIFERITE**

"AT Biopharm" SRL, 61033, or. Harkov, str. Klemenova Dacha, clădirea 12, ap. 11, Ucraina.

#### **2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR**

Unisan, unguent

#### **3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI)**

1 g de unguent conține:

##### **Substanțe active:**

Bigluconat de clorhexidină - 10 mg

Oxid de zinc - 50 mg.

##### **Excipienți:**

Dimetil sulfoxid, PEG-1500, apă purificată

Unguent de culoare albă, cu un miros specific.

#### **4. INDICAȚII TERAPEUTICE**

Tratamentul bolilor de piele cauzate de microflora bacteriană și fungică la bovine, ovine, caprine, cai, porcine, iepuri, păsări de curte, câini și pisici: stafilococ cutanat, toate tipurile de piodermie, eczeme impetigo, candidoza pielii, dermatomicoze (trichofitie, microsporie), seboree, otită externă, răni purulente, abcese superficiale, arsuri.

#### **5. CONTRAINDICAȚII**

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanțele active sau la oricare dintre excipienți.

#### **6. REACȚII ADVERSE**

Nu există date disponibile.

Dacă observați orice reacție adversă, chiar și cele care nu sunt deja incluse în acest prospect sau credeți că medicamentul nu a avut efect vă rugăm să informați medicul veterinar.

#### **7. SPECII ȚINTĂ**

Bovine, ovine, caprine, porcine, cai, păsări de curte, câini, pisici, iepuri.

#### **8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE**

Unguentul se aplică în strat subțire pe zona afectată a pielii de 1-2 ori pe zi până la recuperarea completă. Perioada de tratament depinde de tipul procesului patologic. În orice caz, este necesar de aplicat unguent timp de cel puțin 2-3 zile după dispariția semnelor clinice ale bolii.

Pentru bolile fungice, medicamentul se aplică timp de 7-10 zile de la dispariția semnelor clinice ale bolii.

Pentru leziuni și abcese purulente, se îmbibă tampon de tifon cu unguent și se aplică pe leziune sau cavitatea abcesului. Pansamentele se aplică zilnic până la curățarea completă a maselor purulent-necrotice.

## 9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

A se respecta durata de tratament recomandată.

## 10. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Zero zile.

## 11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra în loc uscat și ferit de lumină, la temperatura între 0°C - 25°C

A nu se utiliza acest medicament de uz veterinar după data expirării marcată pe etichetă.

## 12. ATENȚIONĂRI SPECIALE

### Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Medicamentul nu este prescris în doze subterapeutice și animalelor cu hipersensibilitate la componentele medicamentului.

A evita contactul unguentului cu membranele mucoase ale ochilor.

### Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

La manipularea unguentului Unisan respectați regulile de bază de igienă personală și a tehnicii securității adoptate la manipularea medicamentelor de uz veterinar.

### Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Se utilizează fără restricții.

### Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

A nu se utiliza în combinație cu medicamentele care conțin iod pentru a evita dezvoltarea dermatitei.

### Supradozare:

Dacă unguentul este utilizat în dozele recomandate și pentru perioada specificată, nu se observă supradozaj.

## 13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Solicitați medicului veterinar sau farmacistului informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

## 14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

03/2024

## 15. ALTE INFORMAȚII

Borcane de sticlă sau recipiente de polimer de 200 g, tuburi de aluminiu sau de polimer de 15 g.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

Se eliberează fără o prescripție veterinară.

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare. >