

PROSPECTUL

1. Denumirea medicamentului de uz veterinar

Pihtoin^R.

2. Compoziție

100 g conține:

Substanța activă:

Rășină de pin- 20g

Excipienți:

Compoziția calitativă a excipienților a altor constituenți
Ceară de albini sau faguri artificiali din ceară naturală
Cretă precipitată chimic
Ulei industrial

Unguent de uz extern.

Se prezintă ca o masă omogenă de culoare de la galben-pal până la brună.

3. Specii țintă

Bovine, cabaline, ovine, caprine, porcine, câini, pisici.

4. Indicații de utilizare

Pihtoin^R se indică în tratamentul plăgilor minore, a arsurilor, leziunilor traumatiche a țesuturilor, în caz de eczeme, dermatite, bursite, mastite, contuzie, papiloame și ulcere la animale.

5. Contraindicații

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.

6. Atenționări speciale

Atenționări speciale

Înainte de administrare, suprafața afectată se toaletează și la necesitate se tunde blana.

Precauții special pentru utilizarea în siguranță la speciile țintă

La nou-născuți se utilizează numai în conformitate cu evaluarea beneficiu-risc efectuată de medicul veterinar responsabil.

Particularități deosebite de acțiune a medicamentului la prima administrare sau în caz de anulare nu s-au stabilit.

Se recomandă respectarea dozajului indicat și a modului de administrare pentru a nu diminua eficiența terapeutică. În caz de omitere a unei sau mai multor administrări, utilizarea se reia în aceeași doză, conform aceeași scheme.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează

medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul manipulării unguentului Pihtoin^R e important de respectat regulile comune de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu medicamentele de uz veterinar.

Spălați-vă pe mâini cu apă și săpun după utilizare.

Persoanelor cu hipersensibilitate se recomandă evitarea contactului direct cu medicamentul dat.

În timpul lucrului este interzis fumatul, consumul de alimente și băuturi.

În caz de contact accidental cu pielea sau tunicile mucoase oculare, ele se spală din abundență cu apă.

În caz de ingerare sau apariție a reacțiilor alergice e necesar de adresat la o instituție medicală (cu sine de avut eticheta sau instrucțiunea).

Precauții speciale pentru protecția mediului

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.
Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

Utilizarea în timpul gestației, lactației sau a ouatului

Posibilitatea administrării unguentului femelelor gestante, lactante stabilește medicul veterinar responsabil, în conformitate cu evaluarea beneficiu-risc efectuată.

Interacțiunea cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune

A nu se folosi concomitent cu alte medicamente de uz extern.

Simptome de supradozaj

Nu au fost depistate simptome specifice supradozării.

Restricții speciale de utilizare și condiții speciale de utilizare:

Nu este cazul.

Incompatibilități majore

A nu se amesteca cu niciun alt medicament de uz veterinar de uz extern.

7. Evenimente adverse

Reacții adverse sau complicații în urma administrării conform prospectului dat nu apar.

În caz de sensibilitate sporită la componentele din Pihtoin^R și apariție a iritației, unguentul se șterge cu un tampon și suprafața se spală cu apă. De tratament specific nu este nevoie.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței unui produs. Dacă observați orice reacții adverse, chiar și cele care nu sunt deja enumerate în acest prospect, sau credeți că medicamentul a avut efect, vă rugăm să contactați în mai întâi medicul veterinar. De asemenea, puteți raporta evenimente adverse către deținătorul certificatului de înregistrare sau reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare folosind datele de contact de la sfârșitul acestui prospect de la sfârșitul acestui prospect sau prin sistemul național de raportare: mvnnotificare@ansa.gov.md, tel.: 022-210-156.

8. Doze pentru fiecare specie, căi de administrare și metode de administrare

Pihtoin^R-ul se administrează topic, aplicat în strat subțire pe pânză curată de culoare albă sau pansament de tifon cu care se acoperă porțiunea afectată a pielii, apoi pansamentul se fixează cu un bandaj sau lipici special. Aplicarea se efectuează de 1-2 ori pe zi, timp de 5-10 zile. Pihtoin^R-ul poate fi aplicat direct pe suprafața afectată, ușor masând-ul și în țesutul perilezional.

În cazul contuziilor și mastitelor, Pihtoin^R-ul se aplică sub formă de comprese calde. La fiecare următoare aplicare, medicamentul rămas de la aplicarea precedentă se înlătură cu un tifon steril.

9. Recomandări privind administrarea corectă

Întru excluderea lingerii unguentului de pe suprafața prelucrată, animalelor de companie i se îmbracă guler de protecție.

10. Perioade de așteptare

Zero zile.

11. Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra în ambalajul original.

A se feri de lumină directă a soarelui.

A se păstra separat de produse alimentare și nutrețuri.

A se păstra la temperatură de la +0°C până la +30°C.

Nu utilizați acest medicament de uz veterinar după data expirării marcată pe etichetă după Exp. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

12. Precauții speciale pentru eliminare

Medicamentele nu trebuie eliminate în apele uzate sau deșeurile menajere.

Utilizați sistemele de returnare a medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din acestea, în conformitate cu legislația națională și cu sistemele de colectare aplicabile medicamentului de uz veterinar respectiv.

Solicitați medicului veterinar sau farmacistului informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

13. Clasificarea medicamentelor de uz veterinar

Medicament de uz veterinar care se eliberează fără prescripție.

14. Numerele certificatelor de înregistrare și dimensiunile ambalajelor

240030

Borcane și capace securizate din polimer a câte 15; 40; 140 și 500 g.
Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaj să fie comercializate.

15. Data ultimei revizuirii a prospectului

05/2024

Informații detaliate privind acest medicament de uz veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Republicii Moldova - Registrul de Stat al medicamentelor de uz veterinar (<https://registru.ansa.gov.md/>).

16. Date de contact

Deținătorul certificatului de înregistrare și producătorul responsabil pentru eliberarea seriei și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

AO Uzina” Veterinar”nîe preparatî”,
601508, reg. Vladimir, or. Gusi-Hrustalinîi, str. Himzavodskaia 2

Reprezentanți locali și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.

SRL Zoofarmagro,
MD 2001, mun. Chișinău, str. Camenița 4a
Tel/fax +373 022 855-071; +373 69827427
www.zoofarmagro@mail.ru

17. Alte informații

Pihtoin^R posedă acțiune complexă antiinflamatoare, antimicrobiană și de regenerare.

Rășina de pin din compoziția unguentului, datorită flavonoizilor și fitoncidelor îi oferă proprietăți antiseptice. În urma aplicării pe piele,

Pihtoin^R-ul pătrunde prin glandele sebacee și parțial prin spațiu intercelular. În glande și spațiile intercelulare, componentele biologice active a rășinei trec în stare lichidă și treptat se absorb, sporind dilatarea vaselor, îmbunătățirea circuitului sangvin și accelerarea resorbției produselor inflamatorii.

Pihtoin^R, după gradul de impact asupra organismului face parte din grupul substanțelor puțin toxice (clasa 4 conform GOST 12.1.007-76).

