

PROSPECT

1. Denumirea medicamentului de uz veterinarFluniject^R**2. Compoziție**

1 ml conține:

Substanțe active:

Flunixin meglumin - 83 mg (echivalent cu 50 mg de flunixin)

Excipienți

Compoziția calitativă a excipienților a altor constituenți	Compoziția cantitativă
Salicilat de sodiu	8 mg
Hidroxid de sodiu	40 mg
Alcool benzilic	10 mg
Apă pentru injecții	pînă la 1 ml

Soluție injectabilă.

Soluție transparentă de culoare galben deschisă.

3. Specii țintă

Bovine, porcine, cai de sport și câini.

4. Indicații de utilizare

Fluniject^R este administrat la bovine, cai de sport, porci și câini în calitate de antiinflamator, analgezic și antipiretic în tratamentul complex a bolilor respiratorii, oftalmologice, afecțiuni obstetricale și ginecologice, boli ale aparatului locomotor și alte patologii, însoțite de un proces inflamator acut, de sindromul durerii și hipertermie de diferite etiologii.

5. Contraindicații

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.

Nu se utilizează în cazurile de ulcer gastric și duodenal, sindrom hemoragic, insuficiență renală acută, hepatică sau cardiacă, hipovolemie (cu excepția endotoxemiei sau a șocului septic).

Se interzice administrarea medicamentului intraaortală.

A nu se administra pisicilor, tineretului sub vârsta de 1,5 luni, precum și purceilor cu greutatea corporală mai mică de 6 kg.

6. Atenționări speciale

Precauții speciale pentru utilizarea în siguranță la speciile țintă:

Particularități deosebite de acțiune a medicamentului la prima administrare sau în caz de anulare nu s-au stabilit.

În caz de omitere a unei sau mai multor administrări, utilizarea se reia în aceeași doză, conform aceeași scheme.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

E important de respectat regulile comune de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu medicamente de uz veterinar.

La finisarea lucrului mâinile se spală cu apă caldă și săpun.

În caz de contact accidental a medicamentului cu pielea sau cu tunicile mucoase oftalmice, ele se spală din abundență cu apă.

Persoanelor hipersensibile la componentele medicamentului li se recomandă evitarea contactului direct cu Fluniject^R

În caz de autoinjectare, ingestie sau reacții alergice solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta.

Precauții speciale pentru protecția mediului

Nu este cazul.

Gestație

Medicamentul nu se recomandă să fie folosit femelelor gestante,

Lactație

Fără restricții.

Interacțiunea cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune

Nu se indică Fluniject^R concomitent cu alte remedii antiinflamatorii sau cu efect nefrototoxic. Cu precauție, sub supravegherea medicului veterinar, Fluniject^R va fi indicat concomitent cu preparate pentru anestezie generală, anticoagulante și sulfonamide.

Supradozare

În caz de supradozare animalul poate manifesta simptome de nefropatie, hemoragie gastrointestinală, vomă, acidoză, conținutul crescut a transaminazei în sânge. În astfel de cazuri se indică terapie simptomatică și dezintoxicantă.

Restricții speciale de utilizare și condiții speciale de utilizare, inclusiv restricții privind utilizarea medicamentelor de uz veterinar antimicrobiene și antiparazitare, pentru a limita riscul de dezvoltare a rezistenței

A se administra doar de către un medic veterinar.

Incompatibilități majore

Nu se administrează Fluniject^R concomitent cu alte remedii antiinflamatorii sau cu efect nefrototoxic.

7. Evenimente adverse

La administrarea conform prospectului dat, reacții adverse sau complicații nu apar.

La porcine în locul inoculării poate apărea o tumefiere care trece de la sine timp de 14 zile.

În caz de sensibilitate individuală sporită și apariție a reacțiilor adverse sau a complicațiilor, administrarea se stopează și se recurge la terapie desensibilizantă.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței unui produs. Dacă observați orice reacții adverse, chiar și cele care nu sunt deja enumerate în acest prospect, sau credeți că medicamentul a avut efect, vă rugăm să contactați în mai întâi medicul veterinar. De asemenea, puteți raporta evenimente adverse către deținătorul certificatului de înregistrare sau reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare folosind datele de contact de la sfârșitul acestui prospect de la sfârșitul acestui prospect sau prin sistemul național de raportare: mvnotificare@ansa.gov.md, tel.: 022-210-156.

8. Doze pentru fiecare specie, căi de administrare și metode de administrare

Se indică parenteral, 1 dată în zi:

- *bovine* – în boli respiratorii, ginecologice și alte patologii însoțite de procese inflamatorii: intravenos sau intramuscular 2 ml / 45 kg de greutate corporală (2,2 mg / kg flunixin) până la ameliorarea stării clinice a animalului, dar nu mai mult de 5 administrări consecutive;
- *porcine* – boli respiratorii, ginecologice, sindromul MMA: profund intramuscular în latura gâtului, 2 ml la 45 kg de greutate corporală (2,2 mg / kg flunixin), la necesitate se administrează repetat după 24 ore;
- *câini* - pentru blocarea inflamațiilor și atenuarea durerii în tratamentul bolilor sistemului locomotor, în calitate de antipiretic: intravenoz sau intramuscular, în doză de 0,2 ml/10 kg greutate corporală (1 mg / kg flunixin) până la ameliorarea stării clinice, dar nu mai mult de 3 administrări consecutive.
- *cabaline de sport* - se administrează intravenos:
 - în cazul bolilor aparatului locomotor - 1 ml / 45 kg greutate corporală (1,1 mg / kg flunixin) o dată pe zi, până la ameliorarea stării clinice, dar nu mai mult de 5 administrări consecutive;
 - pentru atenuarea durerii viscerale asociată cu colici - 1 ml / 45 kg de greutate corporală (1,1 mg / kg flunixin), la necesitate se administrează repetat după 24 ore;
 - în caz de endotoxemie, șoc septic și alte boli asociate cu tulburări circulatorii în tractul gastro-intestinal, dar și ca agent antipiretic în cazul infecțiilor bacteriene și virale, în urma intervențiilor chirurgicale - 0,2 ml / 45 kg greutate corporală (0,22 mg / kg flunixin) la fiecare 6 - 8 ore până la ameliorarea stării clinice, dar nu mai mult de 3 administrări consecutive.

9. Recomandări privind administrarea corectă

Pentru evitarea posibilei senzații de durere, se recomandă a nu se administra medicamentul într-un loc de injectare: la animalele mari – în volum mai mare de 5 ml și la animalele mici - în volum mai mare de 2,5 ml.

10. Perioade de așteptare

Porcine – 24 zile,

Bovine – administrare intravenoasă - 8 zile, intramusculară – 35 zile.

Lapte - 60 ore.

11. Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra în ambalajul original.

A se păstra separat de produse alimentare și hrană pentru animale.

A se feri de lumină directă a soarelui.

A se păstra la TOC de la +5 0C până la +25 0C.

Nu utilizați acest medicament de uz veterinar după data expirării marcată pe etichetă după Exp. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Termenul de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar - 28 zile

12. Precauții speciale pentru eliminare

Medicamentele nu trebuie eliminate în apele uzate sau deșeurile menajere.

Solicitați medicului veterinar sau farmacistului informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

Utilizați sistemele de returnare a medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din acestea, în conformitate cu cerințele locale și cu sistemele naționale de colectare aplicabile. Aceste măsuri ar trebui să contribuie la protecția mediului.

13. Clasificarea medicamentelor de uz veterinar

Medicament de uz veterinar care se eliberează cu prescripție.

14. Numerele certificatelor de înregistrare și dimensiunile ambalajelor

240036

Fluniject^R se produce ambalat în flacoane din sticlă cu dopuri din cauciuc și capace securizate din aluminiu, a câte 20 și 100 ml.

Flacoanele se ambalează câte o bucată în cutii din carton. În fiecare ambalaj se conține prospect de utilizare.

Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaj să fie comercializate.

15. Data ultimei revizuirii a prospectului

05/2024

Informații detaliate privind acest medicament de uz veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Republicii Moldova - Registrul de Stat al medicamentelor de uz veterinar (<https://registru.ansa.gov.md/>).

16. Date de contact

Deținătorul certificatului de înregistrare și producătorul responsabil pentru eliberarea seriei:

OOO „Apicena”, reg. Moscova, r. Balașiha, ș. Poltevscoe 4

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.

Republica Moldova

SRL Zoofarmagro,
MD2001 m. Chișinău,
str. Camenița 4a,
tel/fax +373 022 855-071;
tel +373 022 855-073

17. Alte informații

Codul ATCvet: QM01AG90.

Fluniject^R conform gradului de impact asupra corpului se atribuie la substanțele moderat periculoase (pericol de clasa 3 conform GOST 12.1.007), dozele recomandate sunt bine tolerate de către animale, nu are efect embriotoxic, teratogen sau hepatotoxic.