

IHGLUCOVIT sol. inj.	MED-DO 094/2019
Ediția	2
Revizia	02
Pagina	47/104

Anexa nr. 2  
la Ordinul Agenției Naționale  
pentru Siguranța Alimentelor  
nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_ 2019

## PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

### IHGLUCOVIT soluție injectabilă

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.

#### 1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Numele și adresa „Medicamentum” SRL, R. Moldova, r. Anenii Noi,  
s. Merenii Noi

telefon/fax: +373 /265/ 62-3-17, 62-2-46, 62-4-39

e-mail: contact@medicamentum.md

#### 2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

##### Substanța(e) activă(e):

Ihtiol – 40 mg  
Glucoză – 230 mg  
Acid ascorbic – 23 mg  
Alcool etilic – 0,04 ml

##### Lista excipienților:

Apă purificată – până la 1 ml

#### 3. INDICAȚII TERAPEUTICE (pe specii țintă)

Pentru vitele cornute mari în tratamentul și profilaxia subinvoluției uterine după fătări, vaginite, metrite, endometrite.

#### 4. CONTRAINDICAȚII



IHGLUCOVIT sol. inj.	MED-DO 094/2019
Ediția	2
Revizia	02
Pagina	48/104

Nu este cazul.

## 5. REACȚII ADVERSE

Nu sunt.

## 6. SPECII ȚINTĂ

Bovine.

## 7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

După fătările patologice, în primele 2 zile cu scop profilactic se administrează în țesuturile paravaginale ale bazinului în doză de 1ml la 10 kg greutate și se repetă la 48 ore. Cu scop de tratament în același dozaj de 2–4 ori. Înainte de folosire flaconul se încălzește până la  $t+38+40^{\circ}\text{C}$  și se agită bine. Se administrează din seringă cuplată cu ajutorul unui furtun de cauciuc cu lungime de 70–100 cm la acul de tip Bobrov. Locul inoculării se dezinfectează conform cerințelor.

Inocularea se face din dreapta și stânga a anusului printr-o mișcare forțată în țesuturile paravaginale ale bazinului sub unghi de  $30-45^{\circ}$  la adâncimea de 3–5cm în direcția osului stern.

## 8. PERIOADA DE AȘTEPTARE (pentru produsele alimentare țintă) *chiar dacă aceasta este zero, pentru medicamentul de uz veterinar destinat animalelor de la care se obțin produse alimentare*

Pentru lapte – 10 zile, pentru carne –10 zile.

## 9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE


*(condiții de depozitare și condiții de păstrare ale medicamentului de uz veterinar după reconstituire, diluare, prima deschidere)*

La temperatura  $+15+25^{\circ}\text{C}$ , ferit de lumină.

## 10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

## 11. ATENȚIONĂRI SPECIALE (interdicții)

## 12. PERIOADA DE VALABILITATE



**“Medicamentum” SRL**  
**Republica Moldova**

<b>IHGLUCOVIT sol. inj.</b>	<b>MED-DO 094/2019</b>
<b>Ediția</b>	<b>2</b>
<b>Revizia</b>	<b>02</b>
<b>Pagina</b>	<b>49/104</b>

În ambalaj original - 24 luni, de la prima deschidere – 28 zile.

A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

### **13. STATUT LEGAL**

- *se eliberează fără prescripție veterinară*

### **14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR**

Flacoane 100 ml produs ambalate în grup în cutie de carton, însoțite de prospectul de utilizare.

### **15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI**

**16.04.2019**

**NUMAI PENTRU UZ VETERINAR**

