

# PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

## Bipin-T<sup>R</sup>

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

### **1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.**

AO"Agrobioprom", 105064, Rusia, or. Moscova, str. Kazakova 6/1

AO"Agrobioprom", 143985, reg. Moscova, Balașiha, ș. Poltevscoe 4

### **2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA**

Bipin-T<sup>R</sup> (*Bipin-T<sup>R</sup>*). Soluție omogenă pentru obținerea emulsiei de uz extern de culoare de la galben-pal la maro.

Medicamentul Bipin-T<sup>R</sup>, în calitate de substanță activă conține amitraz-12,5%, în calitate de excipienți: neonol AF 9-12, dimetilsulfoxid și orto-xilol.

### **3. INDICAȚII TERAPEUTICE**

Bipin-T<sup>R</sup> se indică în tratamentul și profilaxia varoozei la albini.

### **4. CONTRAINDICAȚII**

Se interzice folosirea medicamentului mai târziu decât cu 14 zile pînă la începutul culesului, pentru evitarea conținutului de reziduuri în miere. A nu se folosi în timpul culesului.

### **5. REACȚII ADVERSE**

La administrarea conform instrucțiunii date, nu apar.

### **6. SPECII ȚINTĂ**

Albini.

### **7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ**

Bipin-T<sup>R</sup> se folosește în perioada de primăvară și toamnă, în perioada cînd este puțin puier. Prelucrarea se face în prima jumătate a zilei, la T<sup>0</sup> C mai mare de 10<sup>0</sup> C a aerului. Înainte de aplicare, 1 ml de preparat se diluiază în 2 litri (0,5 ml/1 litru) de apă caldă (35-40<sup>0</sup> C) și se amestecă minuțios pînă obținem o emulsie omogenă care se folosește pe parcursul unei zile.



Emulsia obținută, cu ajutorul unei seringi se toarnă câte 10 ml într-un spațiu între rame. Se efectuează două prelucrări cu interval de 7 zile.

#### **8. PERIOADA DE AȘTEPTARE**

Mierea se dă în consum uman nu mai devreme decît peste 14 zile după administrarea medicamentului.

#### **9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE**

A se păstra în ambalajul închis al producătorului, ferit de raze solare directe, separat de produse alimentare și furaje, la  $T^{\circ}C$   $0^{\circ}C+25^{\circ}C$ , inaccessibil copiilor.

#### **10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR**

Medicamentul nefolosit se utilizează conform reglementării locale.

Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

#### **11. ATENȚIONĂRI SPECIALE**

Medicamentul Bipin- $T^R$  nu este toxic pentru albini, în doze recomandate nu oferă efect negativ asupra vitalității și productivității familiei de albini.

#### **12. PERIODA DE VALABILITATE**

În ambalaj închis al producătorului - 3 ani din data producerii.

După deschidere nu se păstrează.

A nu se folosi după expirarea termenului indicat pe ambalaj.

#### **13. STATUT LEGAL**

Se eliberează fără prescripție veterinară.

#### **14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR**

Fiole din sticlă a câte 0,5 și 1,0 ml, ambalate în blistere din polimer.

#### **15. DATA ULTIMII REVIZUIRI A TEXTULUI**

20.09.2019

#### **16. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA**

SRL "Zoofarmagro", mun. Chișinău, str. Camenița 4a

tel/fax +373-022-855-071;

Tel +373 022-855-073; [zoofarmagro@mail.ru](mailto:zoofarmagro@mail.ru)



**NUMAI PENTRU UZ VETERINAR**